



**Universidad del sureste**  
**Campus Comitán**  
**Licenciatura en Medicina Humana**

**Escalas**

**Cristel alcalá ochoa**  
**6 “B”**

**Pediatría**

**Dr. Roberto J. Ruiz Ballinas**

# O-RADS

## Score 1<sup>o</sup>

Ausencia de masa ovarica/extraovarica  
Hallazgos fisiologicos en mujeres premenopausicas  
Foliculos < 3cm, Quiste hemorragico < 3cm, Cuerpo luteo < 3cm.

## Score 2

- Quiste unidlar
- Q. unidlar endometriasicos
- Lesión con grasa sin tj solido  
Nodulo de Rockitonsky
- Lesión solida de dark-
- Hidrosalpinx
- Quiste paraovarico

## Score 3

- Q. unidlar proteinases hemaragico.
- Q. Multilocular de cualquier tipo.
- Lesión con tj solido con curva de riesgo
- piosalpinx \*\*\*
- hematosalpinx \*\*\*

## Score 4

- Lesión con tj solido y curva de captación con riesgo intermedio.
- Estudio dinamico de captación de tj solido < al miometrio a los 30-40s \*\*\*

## Score 5

- Cualquier lesión con tj solido con curva de captación de riesgo alto (Ts).
- Carcinomatosis peritoneal
  - Componente solido con riesgo alto
  - Carcinomatosis

# FIGO

## Estadios

## Criterios

IA	Tumor limitado al endometrio
IB	Tumor que invade < 50% del miometrio
IC	Tumor que invade > 50% del miometrio
IIA	Extensión a Glandulas endocervicales
IIB	Invasión al estroma cervical
IIIA	Extensión a serosas uterinas
IIIB	Metastasis a Vagina
IIIC	Metastasis a Ganglios linfaticos
IVA	Extensión a mucosa Cervical
IVB	Metastasis a distancia, incluyendo Ganglios intraabdominales

# BI-RADS

- 0 No concluyente
- 1 Mama normal (estructura normal / sin sospecha)
- 2 Hallazgos Benignos (Quistes / calcificaciones no ca)
- 3 Hallazgos Probablemente benignos (< 2% riesgo de ca)
- 4a Anormalidad con sospecha baja (VPP: 2-10%)
- 4b Anormalidad con sospecha media (VPP: 10-50%)
- 4c Anormalidad con sospecha Alta (VPP: 50-95%)
- 5 Lesión con alto riesgo de malignidad (VPP > 95%)
- 6 Malignidad Confirmada  
(evidencia de Ca y Necesita Tx urgente)