



**Universidad del sureste**  
**Campus Comitán**  
**Licenciatura en Medicina Humana**

**Mapa conceptual sobre Manejo  
Sintomático del Dolor**

**Carlos Rodrigo Velasco Vázquez**  
**Grupo "B"**


**Sexto semestre**

**Cuidados Paliativos**

**Docente: Dr. Agenor Abarca  
Espinoza**

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de abril de 2024

# Manejo Sintomático del Dolor



Experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia a un daño en los tejidos

**Dolor no relacionado al Cáncer**

**Dolor relacionado al Cáncer**

**Alivio para el dolor**

- Disminuir la actv. física
- Disminuye el apetito, sueño
- Pérdida de la calidad de vida

características

- Duración menor de 3-6 meses
- Persiste más allá de lo esperado después de la resolución del trauma

causas

- Dolor de origen primeramente neuropático
- Dolor origen musculo esquelético
- Otros orígenes

- Neuropatías periféricas
- Distrofias simpáticas reflejas

- Artritis y periartrosis
- Síndromes miofaciales
- Síndromes de dolor lumbar

- Vascular
- Cutáneo
- Otros

es aquel

Producido por procesos oncológicos

estadísticas

Al diagnóstico 30-50% de los px experimentan dolor

Tipos de pacientes y dolor

Cáncer avanzado

comprenden

75% de los pacientes y es dolor severo

Dolor y cáncer

40-50%

Reportan dolor moderado-severo

25-30%

Lo reportan como severo

Antes de morir

> 80%

Presentan dolor

Medidas farmacológicas

Opioides

son

Agonistas puros

ejemplos

Morfina, Codeína, Fentanilo

Agonistas-Antagonistas Parciales

ejemplos

Buprenorfina

Agonistas-Antagonistas Mixtos

ejemplos

Nalbufina

Analgesia

objetivos

Mantener la calidad de vida

Prevenir y minimizar los efectos adversos

pretende

Manejar el dolor sin causar somnolencia

al

Utilizar las medidas farmacológicas

desde

El punto de las Consideraciones Farmacológicas

toma al dolor en

Dolor leve

utilizar

Analgésicos no Opioides

como

- AINE
- Paracetamol

son

- Tramadol
- Codeína

Adyuvantes

son

- Esteroides
- Antiepilépticos
- AINE

Dolor severo

utilizar

Opioides potentes

- Morfina
- Hidromorfina
- Metadona

más

Adyuvantes

Escala de EVA

La intensidad que se documenta mediante escalas

va

0-3 Leve; 4-6 Moderado; 7-10 Severo

Bibliografía:

Apuntes tomados en clase