



Mi Universidad

Apuntes

Nombre del Alumno Zahobi Bailon Peralta

Nombre del tema Apuntes

Parcial cuarto parcial

Nombre de la Materia Medicina paliativa

Nombre del profesor Agenor Abarca Espinoza

DISNEA

Experiencia subjetiva de dificultad para respirar que consiste en sensaciones cualitativamente distintas que varían en intensidad

- Es un sintoma discapacitante en pacientes con un deterioro general de la calidad de vida

- (+) común en Pt oncológicos
- La prevalencia varían con la localización del tumor en Pt con neoplasias primarias y el estado de la enfermedad
- Se estima entre 19 a un 64% en Pt con neoplasias primarias de diferentes órganos

CAUSAS

CAUSAS

- Compresión del tumor sobre un bronquio principal
- Depresión y fatiga muscular resp.
- Enfagitis crónica
- Cirugías
- Tx de quimio-terapia radioterapia o qtr

PULMONES

- Derrame P.
- Fibrosis P.
- EPOC
- Asma

RESTRICCION X

- ↑ Presión abdominal
- Ascitis a tensión
- Crecimiento abdominal

CARDIOV.

- St de una cavidad sup
- Arritmias

OTROS

- Anemia
- Anemia grave
- St de ansiedad

Clasificación de disnea

Episódica

St de una cavidad sup

- Signos + Síntomas de congestión pulmonar parcial o completa
- Enf. crónicas causadas por el pulmón
- Pol. (+) frec. conca de pulmón

- Aparición o incremento de una crisis de disnea y dificultad resp. transitoria y disproporcionada con otros signos de disnea en reposo

URGENCIAS EN MEDICINA Paliativa

D M A Scribe

- La atención del paciente en situación de urgencias requiere de conocimiento previo del avance de la enfermedad.

Disponibilidad de recursos suficientes que permita la mayor eficacia y eficiencia.

Los Pt son considerados de riesgo, se les presta una vía intravenosa disponible para posible emergencia con un tapón intermitente y lumbal

Es posible utilizar una sonda con solución salina si no se pueden utilizar por la estructura de color oscuro y no blanco para el

El principal motivo que requiere atención hospitalaria de urgencia es la hemorragia masiva

En los enfermos adictos en fase terminal, una hemorragia masiva es una complicación rara.

- Causas:
- o Hemoptisis masiva
 - o Hemorragia digestiva (hematemesis, melena, vómitos)
 - o Evolución arterial (secundaria tumores)
 - o causas concomitantes (coagulopatías, deficiencia de vit K)

- TX
- en Pt que este cercano a la muerte, es importante considerar una hemorragia grave como un evento terminal si las condiciones del Pt se estabiliza, puede utilizarse una transfusión de sangre
 - El TX dependerá la severidad, de la fuente de sangrado
 - laick, sedación

MEDIDAS GENERALES

- Se deben utilizar Paños
- Succión de color oscuro y no blanco para el

Impacto usual de la sangre

- No tomar signos vitales; es necesario tener más estro de la familia.
- El Pt con hemoptisis de Pt con cáncer en etapa avanzada y si conoce origen de sangrado, con

- El Pt con hemoptisis de Pt con cáncer en etapa avanzada y si conoce origen de sangrado, con
- Si conoce origen de sangrado, con

[Handwritten signature]

Surge o mismo lado que el otro Pt de sangre de otro Pt