



GASTROENTERITIS VIRAL

| Enfermedad | Síntomas | Período de incubación | Duración de la enfermedad | Modo de transmisión | Imagen |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|--|
| Adenovirus entérico | Gripe, fiebre, bronquitis, neumonía, conjuntivitis, faringitis. | 24 – 48 hrs. | 3 a 10 días | Tocar a alguien o darle la mano. el aire, al toser o estornudar. |  |
| Rotavirus | Diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal. | Aproximadamente 2 días. | 3 a 8 días. | Persona a persona por contacto con materia fecal asociado a una mala higiene de manos (fecal-oral). |  |
| Virus Norwalk | Náuseas, vómitos y retorcijones estomacales. | 12 a 48 horas | 1 a 3 días | Por contacto o a través del vómito o las heces de personas infectadas. |  |

| Enfermedad | Síntomas | Período de incubación | Duración de la enfermedad | Modo de transmisión | Imagen |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Salmonella | Dolor abdominal, deshidratación, fatiga, fiebre, diarrea, cefalea, | 12 - 36 hrs | 2 a 7 días | Consumo de alimentos o agua contaminados |  |
| Bacillus cereus | Diarrea, calambres, fiebre y vómitos | 30 min a 6 hrs | 12 a 24 horas. | Consumo de alimentos contaminados, falta de higiene e inadecuadas prácticas de cocinado y |  |
| Shigella | Diarrea, Fiebre, Dolor estomacal, hematoquecia, dispepsia. | 1 - 2 días | 5 - 7 días | Por ingesta de comida o agua contaminadas, contacto persona - persona |  |
| Escherichia coli enteroinvasivo | Diarrea acuosa, hematoquecia, disenteria. | 14 - 50 hrs | 5 - 10 días | A través de la ruta fecal-oral |  |
| Escherichia coli enterohemorrágico | Calambres abdominales, hematoquecia, Diarrea, fiebre, Fatiga, Nausea, Síndrome urémico hemolítico (SUH). | 14 - 50 hrs | Hasta 8 días o más. | A través del agua o los alimentos contaminados y del contacto con animales o personas. |  |