



Mi Universidad

Resúmenes

Dulce Mirely Torres Narvaez

Resumen

Segundo parcial

Técnicas quirúrgicas

Dra. Brenda Paulina Ortiz Solís

Medicina Humana

6°C

Comitán de Domínguez a 02 de mayo del 2024.

ANATOMÍA DE TÓRAX.

El torax es la parte superior del tronco que se encuentra ubicada entre el cuello y el abdomen.

Formación parietal:

- Pared torácica: Esternón, 12 pares de costillas, 12 vertebrales torácicas, músculo intercostales (externos, internos, íntimos).
- Cavidad torácica: el mediastino está ubicado centralmente y limitado por 2 cavidades pleurales lateralmente. El mediastino está formado por cavidades mediastínicas superior e inferior.

► Vagos y nervios: 3 arterias torácicas mas grandes (tronco braquiocefálico, arteria carótida común izq, arteria subclavica izquierda) 3 venas principales (vena cava superior, sistema venoso ácigos, vena accesoria hemiacigosa, venas pulmonares, venas coartáficas, venas torácicas internas, venas cardíacas). drenan en la vena cava superior. Nervios (plexos nerviosos, esofágico, cardíaco y aórtico torácico).

► Órganos: Corazón, pulmones, timo, tráquea, esofago.

La pared torácica consta en: de un esqueleto fósil, músculos, vagos y nervios todo conectados para formar una caja protectora fuerte y flexible.

Ófficio torácico superior se abre hacia el cuello está limitado por los huesos del tórax superior, el manubrio del esternón, el primer par de costillas y el cuerpo de la vértebra T1.

Ófficio torácico inferior está completamente cubierto

Dolce.

Sel/2º

ABDOMEN

► Se trata de una región amplia y compleja que alberga órganos vitales como el estómago, hígado, intestino, páncreas, riñones y la vesícula biliar.

→ Regiones del abdomen.

► Región hipocandrística izquierda lo conforman: el estómago, la porción superior del lóbulo izquierdo del hígado, el riñón izquierdo, el bazo, la cola del páncreas, porciones del intestino delgado, el colon transverso (porción izquierda), el colon ascendente.

► Región hipocandrística derecha conformada por: el hígado, vesícula biliar, el intestino delgado, el colon ascendente, el colon transverso (porción derecha), riñón derecho.

► Región epigástrica lo conforman: el esofago, el estómago, el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones derecho e izquierdo, los uréteres derecho e izquierdo, los glándulas suprarrenales derecha e izquierda, el intestino delgado, el colon transverso.

► Flanco izquierdo. lo conforman: una porción del intestino delgado, una porción del colon descendente, la punta del riñón izquierdo.

► Flanco derecho lo conforman: la punta del hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado, el colon ascendente, el riñón derecho.

Dulce

LAPAROSCOPIA.

Selene 2.0

1) ¿Qué es?

Es el examen del contenido abdominal utilizando laparoscopio e iluminación con fibra óptica.

La laparoscopia al igual que la laparotomía, es recomendada en el abordaje del abdomen con fines de diagnóstico y tratamiento.

Indicaciones.

1) Intervención de las vías biliares. como:

- Colecistitis calculosa aguda y crónica
- Colabcolitosis con obstrucción y sin ella.
- Papilotomía traqueobiliar y anterógrada.
- Colecistografía y colangiografía intraoperatoria.
- Anastomosis colabcolecional

2) Tratamiento de la enfermedad por reflejo gástrico-esofágico.

- Funduplicatura
- Implicación de prótesis de Angelchik.

3) Tratamiento de la cirrosis.

4) Tratamiento de la úlcera duodenal.

- Vagotomía y piloroplastia.
- Tratamiento de la úlcera duodenal perforada
- Anastomosis gastrointestinales.

5) Tratamiento de casos seleccionados de apendicitis aguda.

6) Tratamiento de la hernia inginal.

7) Tx de las enfermedades diverticulares del colon.

APENDICECTOMIA

La apendicectomía es la cirugía para extirpar el apéndice cuando está infectado (**apendicitis**).

El apéndice es una bolita delgada que está unida al intestino grueso, se ubica en el extremo derecho del abdomen.

Existen 2 tipos de cirugía para extirpar el apéndice, el método tradicional es una apendicectomía abierta, el método menos invasivo es la apendicectomía laparoscópica.

Apendicectomía abierta

Se hace un corte de incisión de unos 2 a 4 pulgadas de largo en el extremo inferior derecho del abdomen.

Apendicectomía laparoscópica

Este método es menos invasivo, se hace entre 1 y 3 cortes diminutos, se introduce un tubo largo y delgado (laparoscopio).

La apendicitis es una emergencia médica, está se da cuando el apéndice duele, se inflama y se infecta, existe un riesgo grave de que el apéndice se reviente, puede pasar en 48-72 hrs desde que empieza a tener síntomas y puede causar una infección grave (**peritonitis**).

Otros síntomas suelen ser:

- Diarrea o estreñimiento
- Náuseas y vómitos
- Fiebre
- Disminución del apetito

Bibliografía

S. I. Schwartz Ed., 9^a Ed. Ed.Interamericana/McGraw-Hill (1 vol.). Madrid, 2.010