


SARAMPIÓN

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa.



La observación de las "manchas de Koplik", pequeños puntos blanquecinos que aparecen en el interior de las mejillas en las etapas iniciales de esta enfermedad

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa.

DIAGNÓSTICO

Para confirmar el diagnóstico de sarampión se recomienda tomar una muestra de sangre venosa para la detección de anticuerpos Ig M específicos del virus del sarampión.

TRATAMIENTO

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas.

**NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD EN
MENORES DE 18
AÑOS**

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad respiratoria aguda, de origen infeccioso, que compromete el parénquima pulmonar, ocasionada por la invasión de microorganismos patógenos (virus, bacterias, hongos y parásitos) que fueron adquiridos fuera del ambiente hospitalario

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) constituye la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo.

DIAGNÓSTICO




La radiografía (Rx) de tórax es el mejor método diagnóstico para la neumonía, tanto desde un punto de vista clínico como epidemiológico.

TRATAMIENTO

Amoxicilina, con o sin inhibidor de β -lactamasas, o macrólidos durante 7–10 días.

INVAGINACIÓN INTESTINAL

La intususcepción intestinal es una emergencia médica ocasionada por una obstrucción en el intestino.



DIAGNÓSTICO

Una ecografía u otras pruebas para la obtención de imágenes abdominales.

TRATAMIENTO

El neumoenema, basado en la introducción controlada de aire a través del ano para reducir la invaginación, lo que evita en muchos pacientes la necesidad de cirugía.

Puede ser mortal si no se trata. Afecta con más frecuencia a los niños.

Los síntomas incluyen llantos repentinos y estridentes que aparecen cada quince o veinte minutos, vómitos y heces con sangre y mucosa.