



HELICOBACTER PYLORI

POR BORCELLE

GENERALIDADES

OBJETIVO MODERNO

HELICOBACTER PYLORI ES UNA BACTERIA GRAMNEGATIVA CON FORMA DE BACILO HELICOIDAL QUE HABITA EN EL EPITELIO GÁSTRICO HUMANO. LA INFECCIÓN POR H. PYLORI PUEDE PRODUCIR INFLAMACIÓN DE LA MUCOSA GÁSTRICA QUE PUEDE PROGRESAR LLEVANDO A LA PRODUCCIÓN DE GASTRITIS, ÚLCERA PÉPTICA Y LINFOMA DE TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A MUCOSA

CLINCA

CUANDO SE MANIFIESTAN LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI, SUELEN ESTAR RELACIONADOS CON UNA GASTRITIS O UNA ÚLCERA PÉPTICA Y COMPRENDEN LOS SIGUIENTES:


- DOLOR URENTE O ARDOR EN EL ESTÓMAGO (ABDOMEN)
- DOLOR ESTOMACAL MÁS AGUDO QUE PUEDE EMPEORAR CON EL ESTÓMAGO VACÍO
- NÁUSEAS
- PÉRDIDA DEL APETITO
- ERUCTOS FRECUENTES
- HINCHAZÓN
- PÉRDIDA DE PESO INVOLUNTARIA

DIAGNOSTICO



PRUEBA DE ANTÍGENOS EN HECES
PRUEBA DE REACCIÓN EN CADENA DE LA
POLIMERASA EN HECES.
ENDOSCOPIA

TRATAMIENTO



- INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES
 - SUBSACILATO DE BISMUTO
 - BLOQUEADORES DE HISTAMINA