



Universidad del sureste
Campus Comitán
Licenciatura en Medicina Humana

Trabajos de unidad
Cristel alcala ochoa
6 “B”

Enfermedades infecciosas
Dr. Alejandra de Jesús Aguilar
Sánchez

ANTIHEMETICOS

SON AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA 5HT3 DE LA SEROTONINA

grupo	farmaco	dosis
antagonistas dopaminergicos	metocopramida	<ul style="list-style-type: none"> • VO: 10 mg/8 horas, 30 minutos antes de las comidas.
	domperidona	<ul style="list-style-type: none"> • VO: 10 MG/8HRS antes de los alimentos
Los antagonistas 5 – HT3	ondacetron	VO: 4-8 mg c/8h IV: 5-8 mg dosis unica
	polosetran	VO: 10 mg o 30 mg al dia
Antihistaminico	dimenhidrato	50mg c/4-6h
Antihistaminico H1	Meclizina	25mg c/8 h
fenotiazidas	prometazina	12.5 - 25 mg c/4-6h


SON AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA 5HT3 DE LA SEROTONINA

grupo	farmaco	dosis
corticoides	dexametasona	0,5 a 10 mg al día,
Antihistamínico selectivo H1. Piridoxina: vitamina B6	Doxilamina+piridoxina	10/10 mg/8 h; máx. 70 mg/día Embarazo: 20/20 mg al acostar

EFECTOS ADVERSOS

- sedación
- somnolencia
- aumento del apetito
- efectos anticolinérgicos :
- sequedad de boca, visión borrosa
- estreñimiento, retención de orina
- extrapiramidales: distónicas agudas, incluyendo movimiento involuntario de piernas, gesticulación, tortícolis, crisis oculogíricas, protrusión rítmica de la lengua, habla de tipo bulbar, trismus, opistótonos y, raramente, estridor o apnea.

FISIOPATOLOGIA DEL VOMITO




1 NAUSEAS

Es una sensación desagradable de necesidad de vomitar. La persona también puede sentir mareos, molestias vagas en el abdomen y poca disposición para comer.


2 VOMITO

Es una contracción forzada del estómago que empuja su contenido a través del esófago para salir por la boca.

3 FISIOPATOLOGIA



S. Digestivo



10/04/24
 A. M. A.
 +5