



Universidad del sureste
Campus Comitán
Licenciatura en Medicina Humana

Cuadro informativo

Nombre: Morales Cano Anayancy.

Grupo: "B"

Grado: Sexto semestre

Materia: Enfermedades infecciosas

**Docente: Alejandra de Jesús Aguilar
López.**









ENFERMEDADES INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES



Anayancy Morales Cano






GASTROENTERITIS BACTERIANA



AGENTE CAUSAL	EDAD DE LOS PACIENTES	SINTOMAS	PERIODO INCUBACION	DURACION ENFERMEDAD	TRANSMISION
Salmonella 	Niños <4 años y bebés	<ul style="list-style-type: none"> • Nauseas • Vomito • Dolor abdominal tipo cólico. • Diarrea de intensidad mod. • Fiebre. 	6-48 horas	4-7 Días	Consumo de alimentos o agua contaminados y por el contacto con personas o animales infectados
SHIGELLA 	+ FCTE en niños <5años	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre de alto grado. • Cólico abdominal. • Diarrea mucosanguinolent 	1-7 Días	7 Días	Diseminación directa de persona a persona y a través de agua y comida contaminadas.
ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVA 	Niños (>6 meses) y adultos	<ul style="list-style-type: none"> • Disentería • Diarrea acuosa 	3-8 Días	18-20 Días	Por agua y comida contaminada

AGENTE CAUSAL	EDAD DE LOS PACIENTES	SINTOMAS	PERIODO INCUBACION	DURACION ENFERMEDAD	TRANSMISION
 <p>ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRAGICA</p>	<p>Niños y adultos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea acuosa • Colitis hemorrágica • Síndrome urémico hemolítico 	<p>Varía de 1 a 16 días.</p>	<p>8 Días o más</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitida por comida contaminada (Hamburguesas) • De persona a persona se produce por la vía fecal-oral
 <p>YERSINIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contraída por cualquier persona • Incidencia mayor en niños 	<ul style="list-style-type: none"> • Enterocolitis • Adenitis mesentérica • Ileítis terminal • diarrea leve o severa • Fiebre y calambres abdominales 	<p>3-7 Días</p>	<p>Entre 1 y 3 semanas</p>	<p>Consumo de alimentos o agua contaminados y por el contacto con personas o animales infectados.</p>
 <p>VIBRIO CHOLERAE</p>	<p>5 años de edad o más</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea acuosa súbita • Vómitos con pérdida de líquidos 	<p>24 a 48 Horas</p>	<p>Semanas e incluso hasta varios meses</p>	<p>Consumo de agua contaminada, alimentos contaminados</p>

 <p>BACILLUS CEREUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bebés y niños <5 años, personas • Mayores de 60 años 	<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos y náuseas 	<p>6 - 8 horas</p>	<p>12 y 24 horas.</p>	<p>Consumo de alimentos contaminados por falta de higiene e inadecuadas prácticas de cocinado y conservación</p>
 <p>S. AEREUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bebés y niños <5 años, personas • Mayores de 60 años 	<ul style="list-style-type: none"> • Náuseas • Vómitos • Dolores estomacales y abdominales 	<p>1 - 6 Horas</p>	<p>1 - 2 Días</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alimento - persona • Persona - persona • Animal - persona

GASTROENTERITIS VIRAL

AGENTE CAUSAL	EDAD DE LOS PACIENTES	SINTOMAS	PERIODO INCUBACION	DURACION ENFERMEDAD	TRANSMISION
 <p>ADENOVIRUS ENTÉRICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Prevalente en niños <5 años 	<ul style="list-style-type: none"> <u>D</u>iarrea <u>C</u>alambres abdominales Otros síntomas de gastroenteritis 	1 - 2 días	1 a 2 semanas.	Lavado de manos deficiente o por comer o beber alimentos o agua contaminados.
 <p>VIRUS NORWALK</p>	Niños y adultos mayores	<ul style="list-style-type: none"> Náuseas Vómitos, se puede acompañar de diarrea Retorcijones estomacales 	1 - 2 Días	1 - 2 días	Exposición a personas infectadas o a agua y alimentos contaminados
 <p>ROTAVIRUS GRUPO A</p>	Lactantes y niños muy pequeños,	<ul style="list-style-type: none"> diarrea acuosa nauseas 	1 - 3 Días	5 - 7 Días	Fecal-oral

AGENTE CAUSAL	EDAD DE LOS PACIENTES	SINTOMAS	PERIODO INCUBACION	DURACION ENFERMEDAD	TRANSMISION
 <p>ROTAVIRUS GRUPO B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de los 5 años • Adultos también pero es más leve 	<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos (aparecen como 1er sint.) • Estado febril (va cediendo a las 24 hrs) • Diarrea (como 2do síntoma) 	<p>2 Días</p>	<p>Entre 3 y 8 días</p>	<p>Ruta fecal-oral</p>
 <p>ROTAVIRUS GRUPO C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de los 5 años • Adultos también pero es más leve 	<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos y diarrea líquida durante 3 a 8 días. • Fiebre y dolor abdominal. • Pérdida del apetito y deshidratación. 	<p>24-48 horas.</p>	<p>Entre 3 y 8 días</p>	<p>Fecal-oral</p>