



UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
CAMPUS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS  
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA



## ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CARLOS IGNACIO ALFARO MENDEZ

GRUPO B

SEXTO SEMESTRE

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

DRA. ALEJANDRA AGUILAR

# BACTERIAS

	EDAD DEL PACIENTE	MODO DE TRANSMISIÓN	PERIODO DE INCUBACIÓN	DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD	SÍNTOMAS
SALMONELLA	Niños y adultos mayores	Productos lácteos, aves y huevos	1-3 días	2-7 días	Diarrea sin sangre, náuseas, vómito, dolor abdominal, fiebre y ataque al estado general
SHIGELLA	Niños <5 años	Agua y comida contaminada. Persona-persona	1-4 días	2 a 4 días	Diarrea acuosa (moco o sangre), fiebre, anorexia, ataque al estado general
ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVA	Niños y adultos	Agua y comida contaminada	2-4 días	2-10 días	Diarrea con algo de sangre, fiebre y cólicos
ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRAGICO	Niños y adultos	Comida contaminada	1-4 días	2-4 días	Diarrea sanguinolenta, sx hemolítico urémico
YERSINIA	Niños y adultos	Suelo, agua, alimentos contaminados	4-7 días	1-3 semanas	Enterocolitis, adenitis mesentérica e ileítis terminal
VIDRIO COLERAEE	Niños y adultos	Agua contaminada	1-3 días	1-7 días	Diarrea líquida, fiebre, deshidratación, taquicardia, hipotensión
BACILLUS CERESUS	Niños y adultos	Comida contaminada	1-6 hrs	12-24 horas	Diarrea, vómito y cólicos abdominales
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	Niños y adultos	Comida, objetos contaminado. Piel a piel	2-8 hrs	12-24 horas	Diarrea, vómito y deshidratación grave

# VIRUS

	EDAD DEL PACIENTE	MODO DE TRANSMISIÓN	PERIODO DE INCUBACIÓN	DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD	SÍNTOMAS
ADENOVIRUS ENTERICO	Niños <5 años	Vía fecal- oral y persona-persona	2-6 días	2-6 días	Diarrea líquida, vómito, fiebre y tos precedente
VIRUS NORWALK	Adultos	Vía fecal- oral y persona-persona	1-2 días	2-3 días	Diarrea moderada, vómito, fiebre y cólicos
ROTAVIRUS A	Niños <5 años	Vía fecal-oral	2-6 días	2-6 días	Diarrea líquida, náuseas y vómito
ROTAVIRUS B	Niños y adultos	Vía fecal-oral	2-6 días	2-6 días	Diarrea líquida, náuseas y vómito
ROTAVIRUS C	Niños y adultos	Vía fecal-oral	2-6 días	2-6 días	Diarrea líquida, náuseas y vómito

## BIBLIOGRAFÍA

W. JOHN SPICER. 2009. MICROBIOLOGÍA CLÍNICA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS.  
ELSEVIER ESPAÑA, S.L. TRAVESSERA DE GRÁCIA, 17-21 - 08021 BARCELONA  
(ESPAÑA)