



Mi Universidad

Antieméticos

Joseph Eduardo Córdova Ramírez

Cuadro de antieméticos

2do parcial

Enfermedades infecciosas

Dra. Alejandra De Jesus Aguilar Espinoza

Medicina humana

6to semestre Grupo: C

Comitán de Domínguez, Chiapas 26 de abril de 2024

Antieméticos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombre comercial
Clorpromazina	Fenotiazinas	Vía intravenosa o intramuscular: 25-50 mg. Dosis máxima: hasta 1 gramo al día. Vía oral: 10-50 mg	mareos, sensación de inestabilidad, o dificultad para mantener el equilibrio, falta de expresión en el rostro.	Largactil.
Escapolamina	Anticolínicos	Intramuscular - intravenoso, subcutáneo): 6 µg/kg/dosis (máximo: 0,3 mg/dosis); se puede repetir cada 6-8 horas.	Desorientación - boca seca. Somnolencia - pupilas dilatadas. Mareos – sudoración - dolor de garganta.	Buscapina
Dexametasona	Esteroides	Adultos: 0.5-10mg al día Niños: 0.2mg/kg/día por 3 días.	malestar estomacal · irritación del estómago · vómitos · cefalea · mareos · insomnio · depresión .	Fortecortin. Dexatavegil, Hongosan, Izitan.
Metil-prednisolona	Esteroides	20 a 40 mg al día en adultos y de 8 a 16 mg al día en niños. 80 mg, como dosis máxima recomendada.	malestar estomacal. irritación del estómago. Vómitos - Cefalea – mareos - insomnio.	Solu Moderin, Urbason, Urbason Soluble.
Dimenhidrinato	Antihistamínicos	Vía oral: 12,5-25 mg Vía rectal: medio supositorio de 50 mg dosis máxima de 75 mg cada 24 horas.	Somnolencia - excitación o hiperactividad (especialmente en los niños) - cefalea visión borrosa.	Biodramina - Cinfaman Cinfamar - Solución Saldeva - Salvarina®, Travel Well.
Difenhidramina	Antihistamínicos	Vía intravenosa o vía intramuscular: 1,25 mg/kg/6 h, máximo 50 mg/dosis.	boca, nariz y garganta seca,	Benadryl.

		Vía oral: 1,25 mg/kg/6 h, máximo 150 mg/día (hasta 300 mg/día según otras fuentes).	Somnolencia, mareos, náusea, vómitos, pérdida de apetito, estreñimiento.	
Holoperidol	Butirofenonas	0,5 a 3 mg/día, administrados por vía oral en dosis divididas (2 a 3 veces al día).	Sequedad de boca, aumento de la salivación, visión borrosa, pérdida de apetito, estreñimiento, acidez estomacal.	Haldol
Dome-peridona	Butirofenonas	10 mg hasta tres veces al día, con una dosis máxima de 30 mg/día. En adultos y adolescentes de 12 años o mayores y que pesen 35 kg o más.	aumento del riesgo de trastorno del ritmo del corazón y parada cardíaca.	Domperidona – Gamir - Motilium.
Lorazepam	Benzodiacepinas	Dosis inicial: 0,5 3 mg por vía oral al día, administrados en 2 o 3 dosis al día (máximo 2 mg/dosis). Dosis de mantenimiento: 1-2 mg por vía oral 2 a 3 veces al día.	Somnolencia, sedación, ataxia, confusión, depresión, mareos, cansancio, debilidad, mareos.	Donix, Idalprem, Orfidal y Placinoral.
Alprazolam	Benzodiacepinas	Dosis media: 5-6 mg/día; dosis máxima diaria: 10 mg. Liberación prolongada: dosis inicial de 0,5-1 mg una vez al día Dosis habitual: 3-6 mg/día; dosis máxima diaria: 10 mg.	Somnolencia, aturdimiento, dolor de cabeza, cansancio, mareos, irritabilidad, dificultad para concentrarse, ansiedad, inquietud psicomotora.	Trankimazin, Trankimazin retard, Xanax

Metoclopramida	Benzaminas	0,1-0,15 mg/kg de peso corporal, repetida hasta 3 veces al día por vía i.v.	Somnolencia - cansancio excesivo Debilidad – cefalea – mareos – diarrea – náuseas - vómitos.	Primperam, Aeroflat, Antianorex triple, Suxidina.
Cisaprida	Benzaminas	Adultos: 5-10mg 2 a 4 veces al día Niños: 0.2mg/kg 3 a 4 veces al día.	Diarrea - malestar estomacal. dolor de estómago – cefalea - congestión nasal - estreñimiento.	Prepulsid, Arcasin
Ondasetron.	Antagonistas 5HT3	dosis intravenosa única de 0,15 mg/kg.	Estreñimiento - Somnolencia - sensación de frío o escalofríos – dolor – ardor - entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.	Carvyx , Yatrox , Zofran , Zofran zydis
Granisetron	Antagonistas 5HT3	1 mg (10 µg/kg) de Granisetron Kabi solución inyectable como una inyección intravenosa lenta. No debe exceder 3 mg.	cefalea, estreñimiento, diarrea, e hipersensibilidad.	Kytril, Carvix, Yatrox, Zofran.