



Mi Universidad

Lourdes del Carmen Arcos Calvo

Cuadro de antieméticos

2do parcial

Enfermedades infecciosas

Dra. Alejandra de Jesús Aguilar Sánchez

Medicina humana

6to semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas, 26 de abril de 2024

CUADRO DE ANTIEMÉTICOS.

FÁRMACO	GRUPO	DOSIS	EFFECTOS ADVEROS	NOMBRES COMERCIALES
DOLASETRÓN	antagonistas receptor 5 HT3 del	100mg dosis unica	Cefalea, astenia, anuria, escalofrios	<ul style="list-style-type: none"> • Anzemet • Zamanon
GRANISETRÓN	antagonistas receptor 5 HT3 del	10-40 µg/kg 3 veces al dia	Cefalea, estreñimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Kytril
ONDASETRÓN	antagonistas receptor 5 HT3 del	8-15 kg: 2 mg. 15-30 kg: 4 mg. >30 kg: 8 mg	Cefalea, estreñimiento, adinamia, astenia, somnolencia	<ul style="list-style-type: none"> • Carvyx • Yatrox • Zofran • Zofranzydis
PALONASETRÓN	antagonistas receptor 5 HT3 del	0.25 mg administrados como dosis única	Cefalea, astenia, adinamia, estreñimiento, piel edematizada	<ul style="list-style-type: none"> • Aloxi

CUADRO DE ANTIEMETICOS.

FÁRMACO	GRUPO	DOSIS	EFFECTOS ADVEROS	NOMBRES COMERCIALES
DIMENHIDRINATO	antihistamínico H1	Adultos: 50 a 100 mg c/4-6h no exceder más de 400 mg en 24 h	Somnolencia, hiperactividad, mareos, borrosa, tinnitus, excitaciono, cefalea, visión seca,	<ul style="list-style-type: none"> • Biodramina • Cinfamar • CinfamarSolución • Saldeva • Salvarina • TravelWell
MECLIZINA	antihistamínico H1	25 a 100 mg diarios	Mareo, boca seca, espesamiento de secreciones bronquiales, somnolencia,	<ul style="list-style-type: none"> • Chiclida • Dramine • Navicalm
PROMETAZINA	antihistamínico H1	adultos y adolescentes:50 150 mg al día. en niños de 1 a 3 años:2-15 mg al día	Boca seca, somnolencia, astenia, mareos, tinnitus	<ul style="list-style-type: none"> • Actithiol • Fenegan • Frinova • PsicoSoma.

CUADRO DE ANTIEMÉTICOS.

FÁRMACO	GRUPO	DOSIS	EFFECTOS ADVEROS	NOMBRES COMERCIALES
ALIZAPRIDA	Benzamidas	100-300 mg/día en dosis segmentadas en adultos y 5 mg/kg/día en niños	Agitación, somnolencia, astenia, sedación, xerostomía	<ul style="list-style-type: none"> AlizapridaHUMAX Alizaprid
METOCLOPRAMIDA	Benzamidas	10 mg c/8r, en niños, de 0,1 a 0,15 mg por kg de peso corporal c/8h	Somnolencia, debilidad, cefalea, mareos, diarrea, nauseas	<ul style="list-style-type: none"> Primperan
APREPITANT	Antagonista de NK1	125 mg por vía oral una vez al día una hora antes de empezar la quimioterapia el día 1 y 80 mg por vía oral, una vez al día por la mañana, los días 2 y 3	Debilidad, cansancio, mareos, diarea, estreñimiento, acidez estomacal, dolor estomacal	<ul style="list-style-type: none"> EMEND
ESCOPOLAMINA	antimuscarínicos	0,3 a 0,6 mg administrada por vía intramuscular entre media hora y una hora antes de la anestesia	Desorientación, boca seca, Somnolencia, pupilas dilatadas, Mareos, Sudoración, dolor de garganta	<ul style="list-style-type: none"> Buscapina BuscapinaCompositum ButilescopolaminaAurovitas ButilescopolaminaKalcoks

CUADRO DE ANTIEMÉTICOS.

FÁRMACO	GRUPO	DOSIS	EFFECTOS ADVEROS	NOMBRES COMERCIALES
PERFENAZINA	fenotiazinas	8mgc/12h	Mareos, visión borrosa, dilatación y contracción de pupilas, palidez, perdida del equilibrio	<ul style="list-style-type: none">• Trilafon• Etrafon• Triavil• Triptafen
DOXILAMINA	Antihistaminicos	25mg dia	Nauseas, vomito, resequedad,cefalea, agitación, nerviosismo	<ul style="list-style-type: none">• Cariban
DOMPERIDONA	butirofenonas	10mgc/8h	aumento del riesgo de trastorno del ritmo del corazón y parada cardíaca	<ul style="list-style-type: none">• Motilium