



Mi Universidad

Antieméticos

Andrea Díaz Santiago

Antieméticos

2° parcial


Enfermedades infecciosas






Dra. Alejandra de Jesús Aguilar López






Medicina humana

6°C

Comitán de Domínguez, a 25 de abril de 2024.

ANTIEMÉTICOS	GRUPO FARMACOLÓGICO	DOSIS	EFECTOS ADVERSOS	NOMBRE COMERCIAL	IMAGEN
Difenhidramina	Antihistaminico	Vía intravenosa o vía intramuscular: 1,25 mg/kg/6 h, máximo 50 mg/dosis. Vía oral: 1,25 mg/kg/6 h, máximo 150 mg/día (hasta 300 mg/día según otras fuentes)	temblor, urticaria, escalofríos, sequedad de las mucosas, sedación, somnolencia, mareo, trastornos de la coordinación, constipación, nerviosismo	Benadryl	
Dimenhidrinato	Antihistaminico	Los adultos y los niños mayores de 12 años pueden tomar dimenhidrinato cada 4 o 6 horas	cefalea, insomnio, somnolencia, sedación, visión borrosa, inquietud, confusión, molestias gastrointestinales, boca seca	Biodramina, Cinfamar, Saldeva, Salvarina	
Dexametasona	Esteroides	Adultos: 0.5-10mg al día · Niños: 0.2mg/kg/día por 3 días	Retención de sodio, debilidad muscular, vértigo, úlcera péptica, eritemas,	Fortecortin, Decadron, Dextavegil, Iztan	
Metilprednisolona	Esteroides	de 20 a 40 mg al día en adultos y de 8 a 16 mg al día en niños	malestar estomacal, irritación estomacal, vómitos, cefalea mareos, insomnio, agitación, depresión	Cryosolona, Moderin, Urbason, Urbason soluble, Orapred, Deltason, Prelone.	

ANTIEMÉTICOS	GRUPO FARMACOLÓGICO	DOSIS	EFECTOS ADVERSOS	NOMBRE COMERCIAL	IMAGEN
lorazepam	Benzodicepinas	Niños: 0.05mg/kg dosis IV cada 4-8 hrs. Adultos: 0.5-3mg, 2 o 3 dosis al día y de mantenimiento 1- 2mgVO 2 a 3 veces al día	Somnolencia, sedación, ataxia, confusión, depresión, mareos, cansancio, debilidad, mareos.	Donix, lidalprem, Orfidal, Placionoral, lozam.	
Alprazolam	Benzodicepinas	Niños: 0.04 mg/kg/día Adultos: 3-6mg a día una vez al día y máximo de 10mg	Somnolencia, aturdimiento, dolor de cabeza, cansancio, mareos, irritabilidad, dificultad para concentrarse, ansiedad.	Trankimazin, Trankimazin retard, Xanax	
Clorpromazina	Fenotiazinas	• Adultos: 75-150mg C/8hrs. • niños: 2,5-6mg/kg/día C/4-6hrs	Mareos, sensación de inestabilidad, pérdida del equilibrio, sedación, somnolencia, discinesia	Largactil, ampliactil, torazina y Thorazine	
Prometazina 17	Fenotiazinas	Adultos: 50-150mg/día • Niños: 2-15mg/día	Sedación, somnolencia, mareos, visión borrosa, prurito, boca seca	Phenergan, Actithiol, Fenergan, Frinova	
Domeperidona	Butirofenonas	Adultos: 10mg 3 veces al día, Niños: 0.25mg/hg C/8hrs. 3 veces al día.	depresión, ansiedad, pérdida de libido, ansiedad, agitación, nerviosismo, mareo, somnolencia, cefalea, distensión abdominal,	Motilium, Domperidona Gamir	

ANTIEMÉTICOS	GRUPO FARMACOLÓGICO	DOSIS	EFFECTOS ADVERSOS	NOMBRE COMERCIAL	IMAGEN
Haloperidol	Butirofenonas	Adultos: 0.5-3mg/día C/8hrs. Niños: 0.025-0.085mg/kg/24 hrs. Mayores de 12 años: 1.5-5mg/24 hrs.	Sequedad de boca, aumento de la salivación, visión borrosa, pérdida de apetito, estreñimiento, acidez estomacal	Haldol	
Granisetron	Antagonistas 5HT3	1-3 mg (10-40 mg/kg) y en pediátricos usar 5mg/kg/día.	Insomnio, cefalea, estreñimiento, diarrea, alargamiento del intervalo QT, hipersensibilidad, transaminasas hepáticas elevadas.	Kytril, Carvix, Yatrox, Zofran	
Ondansetrón	Antagonistas 5HT3	Dosis oral de 8mg VO 1-2 hrs, antes del tx con quimioterapia, seguidas de 8mg VO 12 hrs, durante un periodo máximo de 5 días	cefalea, estreñimiento, debilidad, cansancio, escalofríos, somnolencia, escalofríos, sueño, sofocos, sensación de calor,	Carvix, Yatrox, Zofran, Zofran Zydys	
Cisaprida	Benzaminas	Adultos: 5-10mg 2 a 4 veces al día Niños: 0.2mg/kg 3 a 4 veces al día	Diarrea, malestar estomacal, dolor en estomago, cefalea, congestión nasal, estreñimiento, tos, rinitis, sinusitis	Prepulsid, Arcasin	
Metoclopramida	Benzaminas	Adultos: 10mg hasta 3 veces al día Niños: 0.1-0.15mg/kg/peso hasta 3 veces al día	Debilidad, cansancio excesivo, somnolencia, cefalea, mareos, diarrea, constipación, depresión, insomnio	Primperan, Aeroflat, Antianorex triple, Suxidina	

Bibliografía:

Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith L. "Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la Terapéutica". Undécima. Edición. McGraw Hill. 2006.