



Mi Universidad

Tabla de antieméticos

Angel Diego de la Cruz Abarca

Tabla antieméticos

Segundo parcial

Enfermedades infecciosas

Dra. Alejandra de Jesús Aguilar López

Medicina Humana

6 Semestre

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales
Dimenhidrinato	antihistamínico H ₁	Adultos: 50 a 100 mg c/4-6h no exceder más de 400 mg en 24 h,	Somnolencia, excitación o hiperactividad, cefalea, mareos, visión borrosa, boca seca, tinnitus	Biodramina, Cinfamar, Cinfamar Solución, Saldeva, Salvarina, Travel Well
Meclizina	antihistamínico H ₁	25 a 100 mg diarios	Mareo, boca seca, somnolencia, espesamiento de secreciones bronquiales	Chiclida, Dramine, Navicalm
Prometazina	antihistamínico H ₁	adultos y adolescentes:50- 150 mg al día. en niños de 1 a 3 años:2-15 mg al día.	Boca seca, somnolencia astenia, mareos, tinnitus	Actithiol, Fenegan, Frinova, Psico Soma.
Dolasetrón	antagonistas del receptor 5- HT3	100mg dosis unica	Cefalea, astenia, anuria, escalofrios	Anzemet Zamanon
Granisetrón	antagonistas del receptor 5- HT3	10-40 µg/kg 3 veces al dia	Cefalea, estreñimiento	Kytril
Ondasetrón	antagonistas del receptor 5- HT3	8-15 kg: 2 mg. 15-30 kg: 4 mg. >30 kg: 8 mg	Cefalea, estreñimiento, adinamia, astenia, somnolencia	Carvyx , Yatrox , Zofran , Zofran zydis
Palonasetrón	antagonistas del receptor 5- HT3	0.25 mg administrados como dosis única	Cefalea, astenia, adinamia, estreñimiento, piel edematizada	Aloxi

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales
Aprepitant	Antagonista de NK1	125 mg por vía oral una vez al día una hora antes de empezar la quimioterapia el día 1 y 80 mg por vía oral, una vez al día por la mañana, los días 2 y 3.	Debilidad, cansancio, mareos, diarea, estreñimiento, acidez estomacal, dolor estomacal	EMEND
Metoclopramida	benzamidas	10 mg c/8r, en niños, de 0,1 a 0,15 mg por kg de peso corporal c/8h	Somnolencia, debilidad, cefalea, mareos, diarea, nauseas	Primperan
Perfenazina	fenotiazinas	8mg c/12h	Mareos, visión borrosa, dilatación y contracción de pupilas, palidez, perdida del equilibrio	Trilafon , Etrafon, Triavil, Triptafen
Escopolamina	antimuscarínicos	0,3 a 0,6 mg administrada por vía intramuscular entre media hora y una hora antes de la anestesia	Desorientación, boca seca, Somnolencia, pupilas dilatadas, Mareos,Sudoración,dolor de garganta.	Buscapina Buscapina Compositum Butilescopolamina Aurovitas Butilescopolamina Kalceks

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales
Doxilamina	Antihistaminicos	25mg dia	Nauseas, vomito, resequedad, cefalea, agitación, nerviosismo	Cariban
Alizaprida	Benzamidas	100-300 mg/día en dosis segmentadas en adultos y 5 mg/kg/día en niños	Agitación, somnolencia, astenia, sedación, xerostomía	Alizaprida HUMAX Alizaprid
Domperidona	butirofenonas	10mgc/8h	aumento del riesgo de trastorno del ritmo del corazón y parada cardíaca	Motilium