

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Alumno:**

Jeferson Enrique Ogaldes Norio

**Profesor:** Alejandra de Jesús Aguilar Sánchez

**Tema:** Cuadro Antieméticos

**Materia:** Enfermedades Infecciosas

**Grado:** 6°

**Grupo:** "C"


1

Comitán de Domínguez, Chiapas a 26 de marzo de 2024

# Antieméticos

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales	Imágenes
Escopolamina	Anticolinérgicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 6 <math>\mu\text{g}/\text{kg}/\text{dosis}</math> (máximo: 0,3 mg/dosis); se puede repetir cada 6-8 horas</li> <li>Niños: 0.3-0.6mg/kg/ día</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boca seca</li> <li>Somnolencia</li> <li>Mareos</li> <li>Diaforesis</li> <li>Deshidratación</li> <li>Midriasis</li> <li>Taquicardia</li> <li>Delirio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buscapina</li> <li>Dolcopin</li> <li>Hioscina</li> <li>Butilbromuro</li> </ul>	
Metilprednisolona	Esteroides	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 20-40mg día</li> <li>Niños: 8-16mg día</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefalea</li> <li>Malestar estomacal</li> <li>Ansiedad</li> <li>Insomnio</li> <li>Debilidad muscular</li> <li>Mareos</li> <li>Disnea</li> <li>Aumento de peso</li> <li>Sx de Cushing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderin</li> <li>Urbason</li> <li>Orapred</li> <li>Deltasone</li> <li>Prelone</li> <li>Solsolona</li> <li>Disminona</li> <li>Depo-Medrol</li> <li>Solumedrol</li> </ul>	
Dexametasona	Esteroides	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 0.5-10mg al día</li> <li>Niños: 0.2mg/kg/día por 3 días.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hipertensión</li> <li>Inmunosupresión</li> <li>Diabetes</li> <li>Dispepsia</li> <li>Vómitos</li> <li>Debilidad muscular</li> <li>Vértigo</li> <li>Eritemas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortecortin</li> <li>Decadron</li> <li>Dexatavegil</li> <li>Izitan</li> <li>Alindexametasona</li> <li>Decorex</li> </ul>	

# Antieméticos

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales	Imágenes
Alprazolam	Benzodiazepinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 3-6mg a día una vez al día y máximo de 10mg</li> <li>Niños: 0.04 mg/kg/día</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aturdimiento</li> <li>Somnolencia</li> <li>Ansiedad</li> <li>Cansancio</li> <li>Mareos</li> <li>Irritabilidad</li> <li>Cefalea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xanax</li> <li>Trankimazin</li> <li>Tafil</li> </ul>	
Lorazepam	Benzodiazepinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 0.5-3mg, 2 o 3 dosis al día y de mantenimiento 1-2mg VO 2 a 3 veces al día</li> <li>Niños: 0.05mg/kg dosis IV cada 4-8 hrs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedación</li> <li>Ataxia</li> <li>Somnolencia</li> <li>Debilidad</li> <li>Mareos</li> <li>Confusión</li> <li>Depresión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ativan</li> <li>Apolazam</li> <li>Lozam</li> </ul>	
Dom-peridona	Antagonista dopaminérgico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 10mg 3 veces al día.</li> <li>Niños: 0.25mg/kg C/8hrs. 3 veces al día.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansiedad</li> <li>Mareo</li> <li>Perdida de libido</li> <li>Cefalea</li> <li>Distensión abdominal</li> <li>Somnolencia</li> <li>Depresión</li> <li>Estreñimiento</li> <li>Retención urinaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motilium</li> <li>Domperix</li> <li>Motiflat</li> <li>IDON</li> <li>Seronex</li> </ul>	

# Antieméticos

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales	Imágenes
Haloperidol	Antipsicóticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 0.5-3mg/día C/8hrs.</li> <li>Niños: 0.025-0.085mg/kg/24 hrs.</li> <li>Mayores de 12 años: 1.5-5mg/24 hrs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida del apetito</li> <li>Estreñimiento</li> <li>Aumento salivación</li> <li>Sequedad de boca</li> <li>Visión borrosa</li> <li>Nauseas</li> <li>Diarrea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haldol</li> <li>Apracal</li> <li>Haloperil</li> </ul>	
Nabilone	Cannabinoides	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 1 a 2mg 2 veces al día con dosis máxima de 6mg.</li> <li>Niños: No se utiliza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vértigo</li> <li>Somnolencia</li> <li>Sedación</li> <li>Hipotensión</li> <li>Ansiedad</li> <li>Cefalea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cesamet</li> <li>Valeat</li> </ul>	
Dronabinol	Cannabinoides	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos y niños: 5mg/m<sup>2</sup> 1-3 hrs, luego cada 2-4 hrs después hasta un total de 4-6 dosis al día.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taquicardia</li> <li>Hipotensión ortostática</li> <li>Ansiedad</li> <li>Diarrea</li> <li>Euforia</li> <li>Somnolencia</li> <li>Cefalea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marinol</li> <li>Syndros</li> </ul>	

# Antieméticos

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales	Imágenes
Metoclopramida	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 10mg hasta 3 veces al día</li> <li>Niños: 0.1-0.15mg/kg/peso hasta 3 veces al día</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefalea</li> <li>Mareos</li> <li>Somnolencia</li> <li>Cansancio</li> <li>Constipación</li> <li>Confusión</li> <li>Sx extrapiramidal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pramotil</li> <li>Carnotprim</li> <li>Primperan</li> <li>Clo-prim</li> </ul>	 <p>A box of Carnotprim (Metoclopramide) 10mg tablets. The box is white with blue and yellow accents. Text on the box includes 'CARNOTprim', 'METOCLOPRAMIDA', 'Comprimidos 10 mg', and 'Caja con 20 comprimidos'. The manufacturer is Carnot Laboratorios.</p>
Cisaprida	Benzaminas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 5-10mg 2 a 4 veces al día</li> <li>Niños: 0.2mg/kg 3 a 4 veces al día.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefalea</li> <li>Congestión</li> <li>Diarrea</li> <li>Malestar estomacal</li> <li>Estreñimiento</li> <li>Tos</li> <li>Sinusitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepulsid</li> <li>Arcasin</li> <li>Unamol</li> <li>Nodrix</li> <li>Ondax</li> </ul>	 <p>A box of Ondax (Cisapride) 10mg tablets. The box is white with green and yellow accents. Text on the box includes 'ONDAX', 'CISAPRIDA', '10 mg', and '20 COMPRIMIDOS'. The manufacturer is LS SAVAL.</p>
Ondasetrón	Antagonista 5HT3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos 4-8 mg VO/IV c/8hrs</li> <li>Niños: 0.15mg/kg/dosis VO/IV c/6-8hrs (no se recomienda su uso en &lt;2 años)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estreñimiento</li> <li>Cefalea</li> <li>Cansancio</li> <li>Somnolencia</li> <li>Debilidad</li> <li>Escalofríos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ondanex</li> <li>Amal</li> <li>Clodaset</li> <li>Antivon</li> <li>Ondatron</li> <li>Vylkor</li> </ul>	 <p>A box of Odanex (Ondansetron) 8mg solution. The box is white with blue accents. Text on the box includes 'Odanex', 'ONDANSETRÓN 8 mg', and 'LS SAVAL'. It is a 4ml ampoule.</p>
Clorpromazina	Fenotiazinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 75-150mg C/8hrs.</li> <li>Niños: 2,5-6mg/kg/día C/4-6hrs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida del equilibrio</li> <li>Somnolencia</li> <li>Discinesia</li> <li>Acatasi</li> <li>Mareos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Largactil</li> <li>Prozyl</li> <li>Promaxil</li> </ul>	 <p>A box of Largactil (Chlorpromazine) 100mg tablets. The box is white with red and blue accents. Text on the box includes 'Largactil', 'CLORPROMAZINA 100 mg', and 'SANOFI'.</p>

# Antieméticos

Fármacos	Grupo farmacológico	Dosis	Efectos adversos	Nombres comerciales	Imágenes
Dimenhidrinato	Antihistamínicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos: 50-100mg C/4hrs. Máximo 400mg</li> <li>Niños: 12.5mg C/6-8hrs. Máximo 75mg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visión borrosa</li> <li>Somnolencia</li> <li>Cefalea</li> <li>Insomnio</li> <li>Boca seca</li> <li>Confusión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dramamine</li> <li>Anautin</li> <li>Biodramina</li> <li>Vomixtal</li> </ul>	
Difenhidramina	Antihistamínicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos y niños mayores de 12 años: 10 a 50mg C/8hrs.</li> <li>Niños 3 a 12 años: 5mg/kg/día, máximo 300mg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mareo</li> <li>Somnolencia</li> <li>Constipación</li> <li>Nerviosismo</li> <li>Urticaria</li> <li>Escalofríos</li> <li>Sequedad de las mucosas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benadryl</li> <li>Fendramin</li> <li>Dormital</li> </ul>	

## Bibliografía

- Katzung, B. G., & Trevor, A. J. (2016). Farmacología básica y clínica (13a. ed.). México: McGraw-Hill.
- Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith L. "Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la Terapéutica". Undécima. Edición. McGraw Hill. 2006