



Mi Universidad

Cuadro informativo

Luis Angel Vasquez Rueda

cuadro informativo gastroenteritis

1er parcial

enfermedades infecciosas


Dr. Alejandra De Jesus Aguilar Lopez

Licenciatura en medicina humana

6to semestre

GASTROENTERITIS BACTERIANA

ENFERMEDAD	CUADRO CLINICO	PERIODO DE INCUBACIÓN	DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD	METODO DE TRANSMISION
SALMONELLA (MAS FCTE BEBES Y NIÑOS <4 AÑOS)	<ul style="list-style-type: none"> • DOLOR ABDOMINAL • DESHIDRATACIÓN • FATIGA • FIEBRE • DIARREA • HEMATOQUECIA 	12 - 36 HORAS	2 - 7 DIAS	COSUMO DE ALIMENTOS O AGUA CONTAMINADA
SHIGELLA (MAS FCTE <10 AÑOS)	<ul style="list-style-type: none"> • DOLOR ABDOMINAL • FIEBRE • DIARREA • DISPEPSIA 	1 - 2 DIAS	5 - 7 DIAS	POR INGESTA DE COMIDA O AGUA CONTAMINADAS, CONTACTO PERSONA - PERSONA
E. COLI ENTEROINVASIVO (CUALQUIER EDAD)	<ul style="list-style-type: none"> • DIARREA ACUOSA • HEMATOQUECIA • DISENTERIA 	14 - 50 HORAS	5 - 10 DIAS	FECAL - ORAL
E. COLI ENTEROHEMORRAGICO (MAS FCTE. CUALQUIER EDAD)	<ul style="list-style-type: none"> • CALAMBRES • HEMATOQUECIA • DIARREA • FIEBRE • NAUSEAS • SX UREMICO • HEMOLITICO (SUH) 	14 - 50 HORAS	HASTA 8 DIAS O MAS	CONTACTO PERSONA - PERSONA/ANIMAL O POR LA INGESTA DE ALIMENTOS O AGUA CONTAMINADA
VIBRIO CHOLERAEE (MAS FCTE. NIÑOS DE 5 AÑOS O MENORES)	<ul style="list-style-type: none"> • DIARREA (AGUA DE ARROZ) • DESHIDRATACIÓN DE MUCOSAS • FATIGA • NAUSAS • VOMITOS 	2 HORAS Y 5 DIAS	5 - 10 DIAS	AL CONSUMIR ALIMENTOS O BEBER AGUA CONTAMINADOS POR LA MATERIA FECAL DE UNA PERSONA INFECTADA



GASTROENTERITIS VIRAL

ENFERMEDAD	CUADRO CLINICO	PERIODO DE INCUBACIÓN	DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD	METODO DE TRANSMISION
ADENOVIRUS ENTERICO (MAS COMUN EN NIÑOS DE CUALQUIER EDAD)	<ul style="list-style-type: none"> • FIEBRE • BRONQUITIS • NEUMONIA • CONJUNTIVITIS • FARINGITIS 	24 - 48 HORAS	3 - 10 DIAS	CONTACTO PERSONA-PERSONA, VIA RESPIRATORIA (COMO TOSER O ESTORNUDAR)
VIRUS NORWALK (MAS COMUN EN PERSONAS DE CUALQUIER EDAD)	<ul style="list-style-type: none"> • NAUSEAS • VOMITO • DOLORES ABDOMINALES 	12 - 48 HORAS	1 - 3 DIAS	POR CONTACTO O A TRAVÉS DEL VÓMITO O LAS HECES DE PERSONAS INFECTADAS.
ROTAVIRUS (MAS COMUN EN NIÑOS <3 AÑOS)	<ul style="list-style-type: none"> • DIARREA • FIEBRE • VOMITOS • DOLOR ABDOMINAL 	2 - 4 DIAS	3 - 8 DIAS	PERSONA-PERSONA VIA FECAL-ORAL, O POR LA INGESTA DE ALIMENTOS O AGUA CONTAMINADA, O HASTA POR EL CONTACTO CON SUPERFICIE U OBJETOS CONTAMINADOS

