



**Mi Universidad**

**Enfermedades Infecciosas Gastrointestinales.**

*Freddy Ignacio Lopez Gutierrez.*

*Informativo de las principales enfermedades infecciosas gastrointestinales.*

*1er parcial*

*Enfermedades Infecciosas*

*Dra. Alejandra de Jesús Aguilar Lopez.*

*Licenciatura en medicina humana*

*6to semestre Grupo C*

## GASTROENTERITIS BACTERIANA

	<b>SINTOMAS</b>	<b>PERIODO DE INCUBACION</b>	<b>DURACION DE LA ENFERMEDAD</b>	<b>MODO DE TRANSMISION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SALMONELLA</b></li> </ul>	<p>Diarrea, Cólicos estomacales (abdominales), Fiebre, Náuseas, Vómitos, Escalofríos, Dolor de cabeza, Sangre en las heces.</p>	<p>6 horas y 6 días después de la exposición al organismo.</p>	<p>En la mayoría de los casos, los síntomas pueden durar de 4 a 7 días.</p>	<p>consumo de alimentos o agua contaminados con la bacteria Salmonella.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SHIGELLA</b></li> </ul>	<p>Diarrea (a menudo, con sangre o mucosidad), Dolor o calambres estomacales, Fiebre, Náuseas, vómitos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inicio de los síntomas, generalmente oscila entre 1 y 7 días.</li> <li>La mayoría de los casos, los síntomas suelen aparecer alrededor de 1 a 3 días después de la exposición.</li> </ul>	<p>La shigelosis puede durar desde unos pocos días hasta aproximadamente una semana.</p>	<p>Contaminación fecal-oral, Transmisión persona a persona, Contacto con superficies contaminadas.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVO</b></li> </ul>	<p>Diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos.</p>	<p>Generalmente oscila entre 24 y 72 horas después de la exposición al patógeno.</p>	<p>Puede durar de unos pocos días hasta una semana o más, dependiendo de la gravedad de la infección y la respuesta al tratamiento.</p>	<p>Contaminación fecal-oral, Ingestión de alimentos crudos o poco cocidos, Contaminación cruzada, Contacto directo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRAGICO</b></li> </ul>	<p>Dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos.</p>	<p>Generalmente oscila entre 3 y 4 días, aunque puede variar desde 1 hasta 10 días después de la exposición al patógeno.</p>	<p>Puede variar, pero típicamente los síntomas pueden durar de unos pocos días hasta aproximadamente una semana.</p>	<p>Alimentos crudos o poco cocidos, Contaminación cruzada, Agua contaminada.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BACILLUS CEREUS</b></li> </ul>	<p>Síndrome emético, Síndrome diarreico</p>	<p>Generalmente oscila entre 1 y 6 horas después de consumir los alimentos contaminados.</p>	<p>En general, los síntomas suelen durar de uno a tres días, aunque en algunos casos pueden persistir por más tiempo.</p>	<p>Ingestión de alimentos contaminados con la bacteria o sus toxinas.</p>

## GASTROENTERITIS VIRAL

	SINTOMAS	PERIODO DE INCUBACION	DURACION DE LA ENFERMEDAD	MODO DE TRANSMISION
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ADENOVIRUS ENTÉRICO</b></li> </ul>	Diarrea, Malestar abdominal, Fiebre, Náuseas y Vomito, Síntomas respiratorios.	Generalmente oscila entre 2 y 14 días después de la exposición al virus.	En general, los síntomas suelen durar de unos pocos días hasta aproximadamente una semana.	Contacto con heces infectadas o secreciones respiratorias de una persona infectada. Esto puede suceder mediante el contacto directo con una persona infectada, al tocar superficies contaminadas o al ingerir alimentos o agua contaminados.
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>VIRUS NORWALK</b></li> </ul>	Náuseas, Vómitos, Diarrea, Dolor Abdominal, Fiebre y Malestar general.	Generalmente corto, usualmente de alrededor de 12 a 48 horas después de la exposición al virus.	Sin embargo, en general, los síntomas suelen durar de uno a tres días.	transmite principalmente a través del contacto directo con personas infectadas, al consumir alimentos o agua contaminados con el virus, o al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ROTAVIRUS</b></li> </ul>	Fiebre, Vómitos y Diarrea acuosa. Estos Síntomas pueden ser bastante severos y	Generalmente es de alrededor de 1 a 3 días, aunque puede variar en función de diversos	Suelen durar de 3 a 7 días.	El rotavirus se transmite principalmente a través del contacto con heces infectadas. Esto puede

	<p>pueden llevar rápidamente a la deshidratación, especialmente en bebés y niños pequeños.</p>	<p>factores como la cepa del virus, la cantidad de virus a la que se ha estado expuesto y la salud general del individuo infectado.</p>		<p>ocurrir directamente, como cuando un niño toca heces contaminadas y luego se toca la boca, o indirectamente, al tocar superficies contaminadas con el virus.</p>
--	--	---	--	---