



Mi Universidad

Enfermedades Gastrointestinales

Joseph Eduardo Córdova Ramírez

Cuadro informativo sobre diferentes enfermedades

1er parcial

Enfermedades infecciosas

Dra. Alejandra de Jesús Aguilar




Licenciatura en medicina humana

6to semestre Grupo: C




Comitán de Domínguez 10 de marzo de 2024

Enfermedades infecciosas gastrointestinales

Gastroenteritis Bacteriana

| Enfermedad | Edad | Sintomas | Periodo de incubacion | Duracion de la enfermedad | Modo de transmision | Imagen |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|---|
| Salmonella | Mas comun en lactantes y adultos. | diarrea grave o leve, fiebre y vomitos. | 12 a 36 hrs. | Entre 2 y 7 días. | Consumo de alimentos o agua contaminados. |  |
| Shigella | Niños pequeños. | Hematoquecia, fiebre, dispesia, necesidad de defecar. | 1 a 2 dias. | 5 a 7 dias. | Alimentos o agua contaminados y actividad sexual. |  |
| Escherichia coli enteroinvasivo | Primeros 6 meses de vida y < 2 años. | Disenteria, hematoqueica y diarrea acuosa. | 14 a 72 hrs. | Entre 5 a 7 días. | Se transmite por vía fecal oral. |  |
| Escherichia coli enterohemorrhagico | Niños < 2 años. | Nauseas, diarrea con sangre grave, diarrea, fiebre. | 14 a 72 hrs | 8 dias o mas. | Consumo de carne picada cruda o poco cocida y leche cruda. |  |
| Yersinia | Niñez | Colitis ulcerosa, diarrea y fiebre. | 4 a 6 dias. | 6 dias hasta 3 semanas. | Consumo derivados del cerdo crudos o mal cocidos. |  |
| Vibrio cholerae | Niños < 5 años | Colicos, Nauseas, Vomitos, fiebre y escalofrios. | Primeras 2 hrs. | 3 a 5 dias. | A traves de materia fecal. |  |
| Bacillus cereus | < 5 años y > 65 años | Diarrea, fiebre y calambres | 6 y 15 hrs. | 12 y 24 hrs. | alimentos contaminados con la bacteria B. cereus. |  |
| S. aureus | Todas las edades en especial niños. | Nauseas y vomitos | 2 a 4 hrs. | 10 a 20 dias. | Ingesgta de alimentos contaminados. |  |

Gastroenteritis viral

| Enfermedad | Edad | Sintomas | Periodo de incubacion | Duracion de la enfermedad | Modo de transmision | Imagen |
|---------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|---|
| Adenovirus entérico | Niños < 5 años. | Fiebre, Bronquitis, Neumonía, Conjuntivitis. | 24 a 48 hrs | Entre 3 a 10 días | El aire al toser o estornudar y tener contacto con objetos contaminados. |  |
| Virus Norwalk | Adultos y jóvenes. | Nauseas, vomitos y retorcijones en estomago | 10 a 72 hrs. | 1 a 2 días | Contagio de persona a persona por vía fecal u oral |  |
| Rotavirus Gpo. A | Niños < 5 años | Vomito, diarrea acompañada de fiebre y dolor abdominal. | 12 a 48 hrs. | 3 a 8 días. | Ingesta de agua y alimentos contaminados o tener contacto con superficies contaminadas |  |
| Rotavirus Gpo. B | Niños < 5 años | Oliguria, boca y garganta seca, mareos y somnolencia | 12 a 48 hrs. | 2 a 4 días. | Vía fecal u oral. |  |
| Rotavirus Gpo. C | Niños < 5 años | Diarrea, deshidratacion y nauseas | < 24 hrs. | > 3 días | Se diseminan por vía feco-oral, y también mediante vómitos |  |