



Cuadro

Llenifer Yaquelin García Díaz

Cuadro informativo

Parcial I°

Enfermedades Infecciosas

Dra. Alejandra Aguilar Sánchez

Licenciatura en Medicina Humana

6° semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas. A 19 de marzo del 2024.

Cuadro informativo en Enfermedades Gastrointestinales

	Edad	Síntomas	Periodo de incubación	Duración de la enfermedad	Modo de trasmisión
Gastroenteritis Bacteriana					
Salmonella	Los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años	Náuseas, vómito y dolor abdominal tipo cólico, siguiendo una diarrea de intensidad moderada sin sangre, fiebre y ataque al estado general.	De 6 a 48 h	Una semana	La ingestión de productos lácteos, aves y huevos.
Shigella	Niños menores de 5 años	Fiebre de alto grado, cólico abdominal, y diarrea mucosanguinolenta	De 1 a 7 días, con un promedio de 3 días	Se autolimita en 7 días en una persona inmunocompetente.	diseminación directa de persona a persona y a través de agua y comida contaminadas
Escherichia Coli enteroinvasivo	Niños menores de 6 meses a dos años y adultos	Disentería	De 12-72 horas	De 5 a 10 días	Transmisión por agua y comida contaminada
Escherichia coli enterohemorrágica	Niños y adultos	Diarrea sanguinolenta Sd. Hemolítico -urémico	De 1-8 días después de haber ingerido el alimento contaminado.	De 8 días o más	Transmitida por comida contaminada (Hamburguesas)
Vibrio Choleare	No diferencia grupo de edad a excepción de los bebés.	La mayoría son asintomáticos, en casos graves presentan: Diarrea acuosa súbita y vómitos con pérdida de líquidos muy importante (>500 mL/h), provocando una intensa deshidratación, choque	de 24 a 48 h.	De 1-10 días	Por consumo de agua contaminada, alimentos contaminados; la persona infectada puede actuar como medio de propagación al contaminar con

		hipovolemico y desequilibrio de electrólitos			heces agua. La transmisión de persona a persona es poco común.
Gastroenteritis viral					
Adenovirus entérico	Niños menores de 5 años	diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago	De 4 a 12 días	De 1 a 2 semanas	Por contacto directo, fecal-oral, y ocasionalmente mediante agua.
Virus Norwalk	No diferencia grupo de edad	<ul style="list-style-type: none"> • Náuseas • Vómitos • Dolor o calambres estomacales • Diarrea líquida o blanda • Sensación de malestar general 	De uno a dos días	De 24-60 horas	Por ingesta de alimentos contaminados
Rotavirus	niños de entre 3 y 35 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre, que generalmente baja dentro del primer par de días • Náuseas y vómitos • Dolor abdominal • Diarrea • Deshidratación 	De 2 días	tres y ocho días	Fecal-oral

Bibliografía:

Javier Ramos Jiménez, Infectología clínica; Editorial El Manual Moderno, 2012; ISBN 6074482640, 9786074482645

N.º de páginas 580 páginas