



Carlos Fernando Ruiz Ballinas

**Dra. Alejandra De Jesús Aguilar
Sánchez**

Tablas

PASIÓN POR EDUCAR

Crecimiento y desarrollo

3 "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de abril del 2024.

Hemoglobina Hb

Ferroproteína situada en el interior de las hemáticas encargada del transporte de oxígeno hacia tejidos
Es el parámetro que valora la anemia aunque la cifra de eritrocitos sea normal o elevada

Diferenciación de hemoglobina mujeres y hombres:
Las pruebas suelen ser iguales para hombres y mujeres sin embargo, existen sutiles diferencias en algunos aspectos.

Tal como ferritina en caso de mujeres y análisis de antígeno prostático específico

Altitud

Varones: 17-20 g/dl

Mujeres: 16-19 g/dl

5,500 m: V: 54,30 \pm 0,91 M: 54,60 \pm 0,52

4,355 m: V: 55,10 \pm 0,61 M: 51,30 \pm 0,76

Tiempo de coagulación

Esta entre 10 y 13 segundos

Tubo de coagulación:

Se utiliza el tubo con citrato de sodio se utiliza para las pruebas de coagulación de sangre y se aplica al sistema de coagulación "PT, TT, APTT y fibrinogeno"

17/04/20

R. de marcha automática:

- Desaparece a 3 meses
- Se sostiene al niño por el tronco en dirección vertical
- Se inclina levemente el tronco
- La muñeca y los rodillos del mismo lado que el pie presenta

R. de búsqueda

- Desaparece a los 4 meses
- Se activa cuando un objeto entra en contacto con el.

R. de búsqueda:

- Desaparece a los 4 meses
- Se aplica una estimulación suave con la yema del dedo sobre los labios

R. de Babkin

- Desaparece a los 3 meses
- Se acaricia ambas palmas de las manos del bebé
- La boca se abre, los ojos se cierran, el cuello se flexiona y la cabeza se inclina hacia adelante.

R. de Galant

- Desaparece a los 4 meses
- Se sostiene al niño en decubito prono con una mano y se riza el de por uno de los lados

R. tónico asimétrico del cuello:

- Desaparece a los 5 meses
- El brazo y la pierna del lado hacia el que se ha girado la cabeza.

R. de Lado

- Desaparece a los 6 meses
- Se suspende al niño con una mano en el aire
- Levanta la cabeza, endereza la columna vertebral y extiende brazos

R. de paracaidas

- Aparece entre los 4-6 meses y ya no desaparece
- Los brazos y piernas presentan extensión en un movimiento de carácter protector.

Referencias

Ramachandrappa A, Jain L. Health issues of the late preterm infant. *Pediatr Clin N Am*, 2009;56:565-577.

American Academy of Pediatrics. *Neonatal Resuscitation (NRP) Textbook*, 6a ed. 2010, 288.

