

Universidad del sureste
Campus Comitán
Medicina Humana

Nombre del tema:

Fracturas de miembro inferiores y miembros superiores.

Nombre de alumno:

Lizbet Noelia Estrada Carballo

Materia:

Medicina física y rehabilitación.

Grado: 5°

Grupo: "A"

Docente:

Dr. Jorge Arturo López Cadenas.

FRACTURAS DE MIEMBROS SUPERIORES

FX DE CLAVÍCULA

Es una solución de continuidad a cualquier nivel del hueso, resultado de un golpe en el hombro.

CC

- Deformidad.
- Movilidad anormal.
- Aumento de volumen.
- Equimosis.
- Crepitación ósea.
- Deformidad de la cintura escapular.

DX

- Exploración física (exposición ósea, integridad de la piel, evaluar la condición pleuro-pulmonar del lado afectado)
- Radiografía simple AP.
- Tomografía axial computarizada.

tx

- Vendaje Velpau.
- Vendaje en 8.
- Tx conservador (cabestrillo).
- Cirugía (colocación de placa)

FX DE ESCAPULA

Son las fracturas que afectan a cualquiera de las partes de la escápula como puede ser: cuerpo, cuello, glenoides, acromion y apófisis coracoides.

CC

- Deformidad.
- Movilidad anormal.
- Aumento de volumen.
- Equimosis.
- Crepitación ósea.

DX

- Exploración física (exposición ósea)
- Signo de COMOLLY (zona triangular en la zona).
- Radiografía de tórax (AP, proyección axilar y proyección escapular).
- TC para fx glenoides.

tx

- Conservador (cabestrillo y ejercicio precoces de rango de movilidad)
- TX quirúrgico (colocación de placa)

FX DE HÚMERO

Son FX a nivel del tercio proximal del húmero que puede incluir lesiones de la cabeza humeral, tuberosidad mayor y menor y de la porción diafisaria proximal del mismo.

CC

- Deformidad.
- Movilidad anormal.
- Aumento de volumen.
- Equimosis.
- Crepitación ósea.
- Zona de equimosis (hematoma de Hennequin).

DX

- Exploración física (proyección escapular AP, proyección lateral de escápula, proyección lateral-axial de la articulación gleno-humeral).
- TAC.
- Resonancia magnética.

tx

- Inmovilización con vendaje de Velveau o cabestrillo.
- Reducción abierta y fijación interna.
- Colocación de Prótesis.

FX DE RADIO

Es una FX en la que ocurre cuando el área del radio (hueso oseo) y cerca de la muñeca se rompen. Estas FX son muy frecuentes.

CC

- Deformidad.
- Hinchazón.
- Adormecimiento de la parte afectada.
- Dolor.
- Rigidez.

DX

- Exploración física (hinchazón, forma de tenedor de plata, hipersensibilidad)
- Radiografías AP y laterales.

tx

- Inmovilización con férulas.
- Entablillado.
- Vendaje
- Aplicación de una placa.

FX DE CÚBITO

Es la ruptura de la continuidad ósea del cubito, y es una de las FX más frecuentes.

CC

- Hinchazón.
- Dolor en la zona.
- Deformidad en codo y muñeca.
- Incapacidad de girar el brazo.

DX

- Exploración física
- Radiografías.

tx

- Inmovilización con férulas.
- Entablillado.
- Vendaje
- Aplicación de una placa.

FRACTURAS DE MIEMBROS SUPERIORES



