



**Nombre del alumno: Cynthia
Mariana Jimenez Ramirez.**

**Nombre del profesor: María José
Hernández Méndez.**

Nombre del trabajo: Rotafolio.

Materia: Submódulo 1.

Grado: Sexto Semestre.

Grupo: A.

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas 27 de abril del 2024.

POLIFARMACIA

CYNTHIA MARIANA

JIMENEZ RAMIREZ

PROFESORA: MARIA

JOSE HERNANDEZ M.



6TO SEM.



17-04-24

DE ACUERDO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA POBLACION EN 2019 LA ESPERANZA DE VIDA DE LAS PERSONAS EN MEXICO ERA DE 75.1 AÑOS EN PROMEDIO Y PARA EL 2039 SE ESTIMA QUE SEA DE 76.7 AÑOS LA DE LAS MUJERES ES SUPERIOR A DE LOS HOMBRES.



TALES COMO DEPRESION,
EN CONJUNTO SE CONSIDERAN
MARCADOS EN EL ESTADO DE SALUD
QUE SE ASOCIA CON MAYORES
TASAS DE POLIFARMACIA
LA PARTICIPACION DE
MÚLTIPLES MÉDICOS TRATANTES
Y LA MAYOR UTILIZACION
DE LOS SERVICIOS EN LA
ATENCIÓN A LA SALUD SON
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
QUE AUMENTAN EL
RIESGO DE POLIFARMACIA.

INTERACCIONES FARMACOLOGICAS MAS FRECUENTE EN EL PERIOPERATORIO EN EL ADULTO MAYOR.

FARMACO POTENCIALMENTE INADecuADO

<p>BARBITURICOS.</p>	<p>DEPENDENCIA, TOLERANCIA; MAYOR RIESGO DE SOBREDOSIFICACION A DOSIS BAJAS.</p>	<p>EVITAR</p>	<p>ALTO</p>
<p>BENZODIAZEPINAS.</p>	<p>MAYOR SENSIBILIDAD A BENZODIAZEPINAS, DISMINUCION EN SU METABOLISMO DETERIORO COGNITIVO, CAIDAS, FRACTURAS, ETC</p>	<p>EVITAR</p>	<p>MODERADO.</p>

RELAJANTE MUSCULAR	EFECCO ANTICOLINERGICO, SEDACION, RIESGO DE FRACTURAS	EVITAR	MODERADO.
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES	RIESGO DE HEMORRAGIA DE ENFERMEDAD ACIDO PEPTICO.	EVITAR USO CRONICO	MODERADO.
INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES.	INFECCION POR CLOSTRIDIUM, DIFICILE, OSTEOPENIA, OSTEOPOROSIS, Y FRACTURAS.	EVITAR USO MAYOR DE 8 SEMANAS EXCEPTO EN PACI. CON ALTO RIESGO	ALTO.

AINE : ANTIINFLAMATORIOS NO

ESTEROIDES...




POLIFARMACIA:

LA POLIFARMACIA EN EL ADULTO MAYOR TIENE MULTIPLES DEFINICIONES TALES COMO POLIFARMACIA MAYOR, MODERADA Y MENOR, E HIPERFARMACIA EXCESIVA Y SEVERA POR LO QUE LA DEFINICION ESPECIFICA ES:

- EMPLEOS DE MULTIPLES MEDICAMENTOS.

- POR LO GENERAL MAS DE CINCO FARMACOS AL DIA.



LOS MAS UTILIZADOS SON
LOS CRITERIOS DE BEERRS.
CONSTA EN UNA LISTA DE
MEDICAMENTOS, INAPROPIA-
DOS ASI COMO DE LA
RELACION CON PADECIMIEN-
TOS Y CONDICIONES ESPECIFI-
CAS.

ESTOS CRITERIOS VALORAN
53 MEDICAMENTOS, QUE SON
DIVIDIDOS EN TRES CATEGORIAS:

1. MEDICAMENTOS POTENCIAL-
MENTE INAPROPIADOS QUE DEBEN
EVITARSE EN LOS ADULTOS MAY.
2. MEDICAMENTOS POTENCIAL-
MENTE INAPROPIADOS QUE

PUEDEN ACELERAR, CIERTAS ENFERMEDADES O SINDROMES GERIATRICOS.

3. MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR CON UN NIVEL EXTRA DE PRECAUCION.

PREVENCIONES:

1. POTENCIALMENTE INAPROPIADO:

CUALQUIER MEDICAMENTO SIN INDICACION BASADA EN EVIDENCIA.



2. CUALQUIER MEDICAMENTO
INDICADO POR DURACION MAYOR
AL TIEMPO RECOMENDADO.

3. CUALQUIER TRATAMIENTO QUE
IMPLIQUE DUPLICAR UN FARMACO:
DOS ANTIINFLAMATORIOS NO

ESTEROIDES.



ABORDAJE EN EL PERIOPERATO-
RIO:

SE DEBE CONSIDERAR LO ANTES
DISCRETO. REALIZAR UNA EVALUA-
CION SISTEMATICA DE ORGANOS
Y SISTEMAS.



CONSIDERAR LA
DISIMULACION FISIOLOGICA.

DETECTAR DIAGNOSTICO Y EN
SU CASO REFERIR PARA DAR
TRATAMIENTO ESPECIFICO DE
COMORBILIDADES Y ENFERME-
DADES CRONICAS QUE ESTEN
DESCOMPENSADAS O DESCONTRO-
LADAS, CONSIDERAR LAS INTERA-
CCIONES MEDICAMENTOSAS.

CONCLUSION:

LA POLIFARMACIA ES UN SIN-
DROME QUE DEBE SER EVALU-
ADO EN EL PERIODO PERIOPERATO-
RIO. EL AUMENTO DE ESTANCIA
HOSPITALARIA AL IGUAL QUE LA
SARCOPENIA Y LA FRAGILIDAD.

EN LOS ADULTOS MAYORES.