



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Karen Lizeth Nájera Carpio

Nombre del tema: "duodeno y obstrucción intestinal"

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Imagenología

Nombre del profesor: Dra. Karla Sofia Lopez Gutierrez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Setrimestre: 4

Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez Chiapas.

22/05/2024

Duodeno: mide alrededor de 20 a 30 cm de longitud y calibre de 3 a 5 cm se divide en 4

1- bulbo duodenal, mide 5 cm se dirige de izquierda a derecha.

2- retroperitoneal, mide cerca de 12 a 15 cm de longitud, desciende a la derecha

3- Se dirige de derecha a izquierda alrededor del nivel de la tercera vértebra lumbar, mide 8 a 10 cm de largo,

4- dirige hacia arriba, adelante y a la izquierda hasta continuarse con el yeyuno

Mapa mental Duodeno y obstrucción intestinal

Obstrucción intestinal alta:
atresia duodenal, No hay distensión abdominal
doble burbuja
No se evidencia gas distal
12% calcificaciones (peritonitis meconial).

Obstrucción intestinal baja:
vómitos, distensión abdominal y ausencia de paso de meconio.
Dx diferencial: atresia ileal y colónica, múltiples asas intestinales dilatadas, burbujas de jabón (íleon)

