



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

Nombre del Alumno: Leslie Floese Velasco Abarca

Nombre del tema: Trastorno bipolar, depresivos y otros relacionados

Parcial: II

Nombre de la Materia: Psicopatología

Nombre del profesor: Luis Ángel Flores Herrera

Nombre de la Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: VI

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastornos-del-estado-de-%C3%A1nimo/trastornos-bipolares>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001550.htm>
- Apuntes de la clase de psicopatología

TRASTORNO BIPOLAR, DEPRESIVOS Y OTROS RELACIONADOS

SE CLASIFICAN EN

TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR

Se presenta

Cuando los sentimientos

Tristeza, pérdida, ira o frustración

Interferen

Con la vida diaria

Durante

Un largo periodo de tiempo

función

Cambia la manera en la que funciona el cuerpo

SÍNTOMAS

Ánimo deprimido la mayor parte del día

DIAGNÓSTICO

No se atribuye a episodios por dependencia

Deterioro significativo (C,P,F)

Relación con la esquizofrenia

Alteración del sueño e ideas de inutilidad

Insonnio y fatiga

Períodos de síntomas depresivos

Episodio depresivo mayor

Trastorno de la personalidad

TRASTORNO CICLOTÍMICO

Es un trastorno

En la cual una persona

tiene

Oscilaciones del estado de ánimo

Que varían desde

Depresión leve hasta euforia emocional

Es una

Alteración crónica y fluctuante

del

Estado de ánimo

Que

no se cumplen los criterios

Hipomaniacos

Ansiedad y tensión

Letargo, apetito inestable, insomnio

Relación con trastorno depresivo y de personalidad

Deterioro social (P,S,F)

Sensibilidad, enfado

Episodio depresivo mayor

Distintos entre sí

Maníaco

Hipomaniaco

TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL

Es una

Expresión de labilidad afectiva, euforia

Síntomas de ansiedad

Que se

Repeten durante la fase premenstrual

Del ciclo

Síntomas

5 síntomas de presentación: Antes/durante/después

Al rededor del inicio de la menstruación

Episodio de depresión mayor (Estado de ánimo)

Episodio hipomaniaco (ocasionalmente)

Síntomas

Ansiedad y tensión

Letargo, apetito inestable, insomnio

Relación con trastorno depresivo y de personalidad

Deterioro social (P,S,F)

Sensibilidad, enfado

Episodio depresivo mayor

Distintos entre sí

Maníaco

Hipomaniaco

TRASTORNO BIPOLAR

Definido por la presencia de

Al menos

Un episodio maniaco

Y

Episodios depresivos

Definido por la presencia de

Al menos

Episodios depresivos mayores

Con un episodio hipomaniaco

Pero sin

Episodios maniacos completos

Síntomas

Exceso de energía/emoción

Deterioro social (psicosis)

Sin adicción

Exceso de energía

Episodio hipomaniaco

Episodio de depresión mayor

Síntomas

No hay deterioro social

Esfere social (cambio conductual)

Invariabilidad del paciente

Sin antecedente de sustancia

Características sociales y culturales

La mujer

CARACTERÍSTICAS

Episodio maniaco (consecutivamente)

No como

Episodio de depresión mayor (Estado de ánimo)

Episodio hipomaniaco (ocasionalmente)

SÍNTOMAS

Exceso de energía/emoción

Deterioro social (psicosis)

Sin adicción

Exceso de energía

Episodio hipomaniaco

Episodio de depresión mayor

DIAGNÓSTICO

5 síntomas de presentación: Antes/durante/después

Al rededor del inicio de la menstruación

Episodio de depresión mayor (Estado de ánimo)

Episodio hipomaniaco (ocasionalmente)

Síntomas

Ansiedad y tensión

Letargo, apetito inestable, insomnio

Relación con trastorno depresivo y de personalidad

Deterioro social (P,S,F)

Sensibilidad, enfado

Episodio depresivo mayor

Distintos entre sí

Maníaco

Hipomaniaco

Sin origen de dependencia/enfermedad

Afección afectiva, cambio de humor

Dolores e Inchazón mamaria

Poco después

Características sociales y culturales

La mujer

Sin antecedente de sustancia

Invariabilidad del paciente

Esfere social (cambio conductual)

No hay deterioro social

Síntomas

Exceso de energía/emoción

Deterioro social (psicosis)

Sin adicción

Exceso de energía

Episodio hipomaniaco

Episodio de depresión mayor

Síntomas

No hay deterioro social

Esfere social (cambio conductual)

Invariabilidad del paciente

Sin antecedente de sustancia

Características sociales y culturales

La mujer

Sin antecedente de sustancia

Invariabilidad del paciente

Esfere social (cambio conductual)

No hay deterioro social

Síntomas