



Alumna: Maritza Yocelin Roblero Bravo
materia: psicopatología
licenciatura en psicología
fecha de entreg: 16 de junio del 2024

TRASTORNO BIPOLAR I Y II

- Maniaco
- episodio Hipo maniaco
- episodio de depresión mayor

Manía (consecutivamente)
hipomanía (ocasionalmente)
depresión Mayor (estado de ánimo)

Exceso de energía

Lista de actividades

Invariabilidad px

Esfera social (cambio conductual)

No hay delirio social

TRASTORNO CICLOTIMICO

```
graph TD; A[TRASTORNO CICLOTIMICO] --> B[Alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo, síntomas de hipomaníaco]; B --> C[No se cumplen los criterios de episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco];
```

Alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo, síntomas de hipomaníaco

No se cumplen los criterios de episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

Cambio de peso y la ideación suicida.
Animo deprimido la mayor parte del día Insomnio

Alteración del sueño e
ideaciones de inutilidad

Deprimido, triste,
desesperanzado, desanimado

Sin antecedentes de
dependencia

relación con la
esquizofrenia

no se atribuye a
episodios por
dependencia

TRASTORNO DISFORICO PREMENSTRUAL

Expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo

Remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después.

Características sociales y culturales de la mujer

Síntomas (Cambios de humor, sensibilidad, ansiedad y tensión)

deterioro en lo social

falta de concentración, apetito inestable, insomnio

Referencias bibliográficas

Antología UDS