cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Marco Antonio Méndez Ventura

Nombre del tema: trastornos

Parcial : 3

Nombre de la Materia: psicopatología

Nombre del profesor: Luis Ángel flores herrera

Nombre de la Licenciatura: psicología

Cuatrimestre:6

TRASTORNO

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

CONCEPTO

Las obsesiones son pensamientos, imágenes de escenas terroríficas o violentas de naturaleza repetitivo o persistente

SINTOMAS

Obsesiones y compulsiones, más de 1 hora diaria (malestar en lo social) sin origen de droga o sustancia. Relación con T. De ansiedad, T. C alimentario, T. Psicoticos

TRICOTILOMANIA

BASE DEL TRASTORNO

Acto recurrente de arrancarse el pelo, cuero cabelludo, las cejas, los párpados, sentimiento de pérdida de control, molestia y vergüenza.

SINTOMAS

Forma recurrente de arrancarse el cabello, repetición constante de episodios, deterioro social, sin origen o afección médica.

TRASTORNO DE EXCORIACION

BASE DEL TRASTORNO

Urgencia de tocar, frotar, rascar, restregar, apretar o excavar la piel, la cara, los brazos y las manos.

SINTOMAS

Recurrente daño a la piel, repetición de la disminución de episodios, deterioro en lo social, sin origen de alguna sustancia, relación con trastorno psicótico, dismorfia corporal e intento suicida.

TRASTORNO

TRASTORNO ESTRES POSTRAUMATICO

CONCEPTO

Expresión emocional, miedo, impotencia, horror, y recuerdos del evento traumático

SINTOMAS

Presencia de 1 o más eventos traumáticos, alteración cognitiva negativa y del estado de ánimo. Deterioro social.

AMNESIA DISOCIATIVA

BASE DEL TRASTORNO

Una desconexión o ruptura en los procesos de memoria, identidad percepción y consciencia. Desarrollado por situaciones altamente traumáticas.

SINTOMAS

Incapacidad para recordar información autobiográfica, deterioro en lo social, sin atribución del origen de consumo de su entorno, disociación de la personalidad.

TRASTORNO DE APEGO REACTIVO

BASE DEL TRASTORNO

Este trastorno se da hasta los 5 años y si no se trata puede llegar hasta la adultez, y desarrollar un apego, lactancia a la primera infancia, (0-5) años y el Niño requiere una imagen de protección, y confianza.

SINTOMAS

Comportamiento timodo y retraído, alteración social y emocional, desarrollo a partir de los 9 meses, irritabilidad y tristeza.

Bibliografía

https://childmind.org/es/articulo/informacion-basica-sobre-el-trastorno-de-estres-postraumatico/#:~:text=El%20trastorno%20de%20estrés%20postraumático%20(PTSD%2C%20por%20sus%20siglas%20en,naturales%20pueden%20desencadenar%20el%20PTSD.

https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-disociativos/amnesia-disociativa

Apuntes