

TRASTORNOS DEPRESIVOS, TRASTORNO BIPOLAR Y RELACIONADOS

TRASTORNO BIPOLAR 1

trata

episodio maniaco(consecutivamente)

el

episodio hipomaniaco(ocasionalmente)

y el

episodio de depresión mayor (estado de ánimo)

exceso de energía(emoción)

como tambien el

listado de actividades

deterioro social(psicosis)

sin adicción

TRASTORNO BIPOLAR 2

trata

episodio hipomaniaco

episodio de depresión mayor

exceso de energía

listado de actividades

invariabilidad px

esfera social (cambio conductual)

no hay deterioro social

sin antecedente de sustancia

CRITERIOS TEMPORALES (especificaciones de duración)

leve(2 síntomas)

moderado grave(4 a 5 síntomas)

moderado(3 síntomas)

grave(4 a 5 o mas, con agitación motora)

TRASTORNO CICLOTIMICO

es la

alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo

están los

síntomas hipomaniacos y periodos de síntomas depresivos que son distintos entre si

DIAGNÓSTICO

no se cumplen los criterios de episodio depresivo mayor, maniaco o hipomaniaco

TC

hipomania (TB1-TB2)

T,depresión (periodo de síntomas A,B,C,D,E,F)

para el dx, no se cumple el T.BI

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

se muestra en el

cambio de peso y la ideación suicida, ánimo deprimido la mayor parte del día, insomnio y la fatiga

esta

deprimido, triste,desesperanzado,desanimado o "por los suelos"

como tambien la

alteración del sueño e ideaciones de inutilidad

SÍNTOMAS

los cuales son

ánimo deprimido la mayor parte del día(mania)

deterioro significativo(s,f,p)

sin antecedente de dependencia

relación con la esquizofrenia y T.de la personalidad

no se atribuye a episodios por dependencia

estado de ánimo deprimido(mania)

perdida de interés(hipomania)

ideación suicida, inutilidad,culpabilidad

TRASTORNO DISFORICO PREMENSTRUAL

es la

expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo

ademas

remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después

son las

características sociales y culturales de la mujer

tambien

síntomas conductuales y físicos

se encuentran los

SÍNTOMAS

son

5 síntomas de presentación antes, durante y después

tambien están los

síntomas(afección afectivo, cambio de humor, sensibilidad, enfado, ansiedad y tension)

esta la

anhedonia(interés), falta de concentración, apetito inestable, letargo, insomnio, dolores e hinchazón mamaria

sono tambien

deterioro en lo social(p,s,f)

sin origen de dependencia/enfermedad

relación con T.depresivo, personalidad