

Exploración laríngea, tos, tráquea.

Forma de realizarlo:

Forma de realizarlo: Explorar por palpación y auscultación. Palpar utilizando los dedos de ambas manos, una a cada lado en la región laríngea, haciendo una presión ligera en un principio y más intensa a continuación. Auscultar el paso del aire en la región laríngea.



PROVOCAR LA TOS. Forma de realizarlo: Aplicar una presión ligera y repetida sobre la laringe, en la zona de unión con el primer anillo cartilaginoso de la tráquea u ocluir los oídos con un paño durante 30-60 segundos.

EXPLORAR LA TRÁQUEA.

Forma de realizarlo: Explorar por palpación y auscultación. Palpar con los dedos de la mano a lo largo de todo su recorrido. Auscultar el paso del aire a diferentes niveles.

TRAZAR LAS LÍNEAS DEL PARADIGMA DE EXPLORACIÓN PULMONAR. Líneas horizontales: Ilio-isquiática y del encuentro. Líneas verticales: Cortan tangencialmente a la 5ª y 10ª costilla. LÍMITES PULMONARES.



Percusión, palpación, venas yugulares.

SUPERFICIAL Y PROFUNDA) EL PULMÓN.

Forma de realizarlo: Percutir con el martillo y plexímetro desde la zona craneal a la caudal y desde la dorsal a la ventral, primero suavemente para delimitar el pulmón (superficial) y luego más fuerte para buscar alteraciones (profunda). Percutir en los espacios intercostales. El sonido normal es claro o pulmonar.

EXPLORAR MEDIANTE AUSCULTACIÓN EL PULMÓN

Forma de realizarlo: Auscultar desde la zona craneal a la caudal y desde la dorsal a la ventral. Colocar el fonendoscopio entre los espacios intercostales.

AUSCULTAR LOS FOCOS DE PRO- YECCIÓN DE LAS VÁLVULAS CARDÍACAS.

Forma de realizarlo: Explorar por palpación.

Colocar la palma de la mano con los dedos extendidos sobre la zona de proyección del corazón en la región costal (precordial) a nivel de los 4° y 6° espacios intercostales en el lado izquierdo.



EXPLORAR LAS VENAS YUGULARES Y EL PULSO VENOSO NEGATIVO (1/2).

Forma de realizarlo: Venas yugulares.

Explorar por inspección y palpación. Inspeccionar en la zona de proyección en el cuello (surco o gotera de la yugular) e ingurgitar la vena presionando con los dedos de una mano en la entrada del pecho y palparla con los dedos de la otra mano. Explorar mediante auscultación. - V. pulmonar. 2°-4° espacios intercostales iz. por encima del borde esternal. - V. aórtica. 4° espacio intercostal iz. a nivel de la articulación del hombro. - V. mitral. 4°-6° espacios intercostales iz. por encima del borde esternal. - V. tricúspide. 3°-5° espacios intercostales der. a nivel de la unión costochondral.

EXPLORAR LAS VENAS YUGULARES Y EL PULSO VENOSO NEGATIVO

Forma de realizarlo: Pulso venoso negativo. Explora por inspección. Tomar simultáneamente el pulso en la arteria facial y comprobar que no coinciden. Es fisiológico en los bóvidos.

