



**Mi Universidad**

NOMBRE DEL ALUMNO: NERI RAMÍREZ ÁLVAREZ

NOMBRE DEL TEMA: INMOVILIZACIÓN DEL FELINO

PARCIAL: 4

NOMBRE DE LA MATERIA: METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

NOMBRE DEL PROFESOR: PEREZ LOPEZ HUGO ALEXANDER

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: 3

# INMOVILIZACIÓN DEL FELINO

## Inmovilización Del Felino

Si se precisa una mayor inmovilización para evitar que el gato gire la cabeza y muerda, se puede sujetar su morrillo, o piel suelta del cuello, con una mano. De esta forma, el gato queda perfectamente inmovilizado sobre la mesa, sujetando el cuello con una mano y estirando con la otra las extremidades posteriores



Con una jaula  
Cuando son muy agresivos

Con una toalla  
Cambiando la mano y el brazo que sujetan la cabeza y presiona el lomo, repetir la maniobra con el otro extremo de la toalla fijándola con firmeza. Una vez hecho, levantar el gato y envolver con el resto de la toalla la parte abdominal de la mascota de atrás hacia delante



## Estado De Deshidratación De Un Felino



Si la piel vuelve al instante a su forma inicial y no muestra ninguna imperfección, lo más probable es que el gato esté hidratado. En cambio, si tras estirar su piel tarda en volver, éste puede considerarse un síntoma de deshidratación

## Técnica de estudio coproparasitoscópico de flotación.



El CPS directo es una técnica que facilita la observación de formas móviles como trofozoítos y larvas, es una prueba fácil, rápida y de bajo costo. Consiste en la observación en fresco de una muestra de materia fecal con solución salina, puede o no ser teñida con algún colorante.

