

**Nombre del alumno: Ibssen Jair Castorena
Uriostegui.**

Materia: Manejo y sujecion

Docente: Alexander Perez Perez.

Nombre del trabajo: Super nota.

grado y grupo: 3°B

INMOVILIZACION DE FELINOS



1

Inmovilización total: Técnica en la que se mantiene al gato recostado, con su espalda contra la persona que lo manipula, mientras que se le sujetan las patas, delanteras y traseras y la cabeza. De esta manera se inmovilizan, cabeza, cuerpo y extremidades de los felinos para su examen.

2

INMOVILIZACION PASIVA

Sujetando al felino con la menor restricción posible, permitiéndole mover cabeza, cuerpo y extremidades, además de dejarle elegir la postura en que va a ser examinado, ya sea de pie, sentado o acostado.

3

LA CLIPNOSIS

Es una forma de inmovilización de nuestros gatos que se ha hecho durante muchos años y que consiste en apretar o pinzar la piel de detrás del cuello de nuestro minino, lo que le provoca un estado de inmovilidad.

ESTADO DE DESHIDRATACION



1

La deshidratación felina ocurre cuando su organismo tiene menos agua de la que necesita para realizar sus funciones vitales.

2

SINTOMAS

- Encías y boca secas y pálidas
- Ojos hundidos
- Depresión
- Falta de apetito
- Jadeo y respiración agitada
- Piel sin elasticidad (si pellizcas la piel del gato no regresa a su forma normal)

3

SIGNOS TEMPRANOS

- Disminución o cese en el consumo de agua
- Disminución en el consumo de alimento
- Disminución o ausencia de orines en el arenero
- Estreñimiento o dificultad para defecar

COPROPARASITARIO POR FLOTACIÓN



1

Es una técnica muy utilizada en parasitología, se utiliza para la detección de protozoos, huevos y larvas de helmintos, aún cuando estén presentes en pequeñas cantidades.

2

La técnica produce una dispersión y separación de los huevos del material fecal, en soluciones saturadas de azúcares o sales.

3

Esto se basa en la diferencia de densidad de las soluciones, la mayoría de los huevos de parásitos tienen una menor densidad que las soluciones utilizadas.