MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: NEVI SHERLY GARCIA RODRIGUEZ
NOMBRE DEL TEMA: PARTO
PARCIAL: 3
NOMBRE DE LA MATERIA: FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 1
NOMBRE DEL PROFESOR:M.V.Z GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
CUATRIMESTRE: III

LUGAR Y FECAHA DE ELABORACION: LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS A 06 DE JULIO DEL 2024

PARTO

ES EL

NACIMIENTO DEL FETO SEGUIDO DE LA EXPULSIÓN DE LA PLACENTA

FASES DEL PARTO

ESTA DIVIDO EN

Tres etapas

SON

- DILATACIÓN DEL CÉRVIX
  - Dura de 2 a 3 horas en vacas adultas y de 4 a 6 horas en vaquillonas
- NACIMIENTO DEL TERNERO
  - Las contracciones uterinas ayudan al descenso de la cabeza del neonato
- EXPULSIÓN DE LA PLACENTA
  - Ocurre 3 a 6 horas postparto.

CUIDADOS DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO

SE DIVIDE EN

- CUIDADOS DEL NEONATO
  - Inmediatamente e después del parto
  - VERIFICAR
    - Respiración: Si no respira, estimular con palmadas o masajes.
    - Vías aéreas: Limpiar mucosas y secreciones.
    - Cordón umbilical: Cortar a 2 cm del abdomen y desinfectar con yodo.
    - Temperatura: Secar y mantener en ambiente cálido.
- CUIDADOS DE LA MADRE
  - VERIFICAR EL
    - Estado de los órganos reproductores
      - Presencia de otro ternero
      - Hernias o perforaciones uterinas y vaginales
      - Hemorragias

PUERPERIO

ES EL

Periodo de tiempo que transcurre entre el parto y el restablecimiento de las condiciones del tracto genital a su estado de pregravidez

DONDE EXISTE

Involución uterina

DONDE

El útero reduce su tamaño, al endometrio sufre un proceso regenerativo (Dura 30 días) y las condiciones de albergar una nueva gestación

RETENCIÓN DE LA PLACENTA

ES LA

No expulsión de las membranas fetales

DESPUES DE

12 A 24 HORAS DEL PARTO

Factores

- Problemas de tipo infecciosos (abortos)
- Metabólicos (hipocalcemia, cetosis, síndrome de la vaca gorda)
- Nutricionales (deficiencias de Selenio y vitamina E)
- Errores de manejo (demasiada intervención en los partos)

DISTOCIA

ES UN

Problema común que incrementa el riesgo de mortalidad de la madre y, especialmente, de los neonatos

FACTORES

- GRADO DE DILATACIÓN DEL CUELLO DEL ÚTERO
- TORSIÓN DE CUELLO DEL ÚTERO
- TAMAÑO DEL TERNERO
- VITALIDAD

RESOLUCIÓN DE DISTOCIA

ES LA

Manipulación necesaria para corregir la presentación, posición y actitud del feto que se presenten de manera anorma

INTERVENCIONES

- Maniobras obstétricas
- Extracción forzada
- Fetotomía
- Operación cesárea

CÉRVIX

ES LA

Estructura cartilaginosa de tres anillos que sirve como punto de adherencia para músculos del aparato reproductor y oral para conectar el útero con la vagina

- FUNCIONES
  - Impide la entrada de agentes patógenos
  - Sellado mucoso
  - Genera flujo de la vagina y al útero
  - Produce moco cervical
- CARACTERISTICAS
  - Tiene una pared muscular gruesa
  - Su interior tiene 3 o 4 anillos

ANOMALIAS DEL CERVIX

- CÉRVIX BÍFIDO
  - Presenta
    - Impide la fecundación, ya que el esperma no puede pasar
    - CAUSAS
      - Aplasia segmentaria
      - Quistes congénitos
      - Conductos accesorios
- ENFERMEDAD QUÍSTICA ÓVÁRICA BOVINA
  - ES UNA
    - Una condición en la cual los folículos ováricos no ovulan y no se convierten en los cuerpos lúteos normales.
    - Causa infertilidad
    - ENTRE LA TROS
      - Ciclicidad: Los folículos crecen y quistes, pero no ovulan.
      - Anovulatorio: Los folículos no crecen y quistes, no ovulan.

FUNCIÓN DE LA OXITOCINA

HORMONA QUE

Aumenta la amplitud y la frecuencia de las contracciones del útero.

ORIGENES

- HIPOTALAMO
  - COMO UN
    - NEUROTRANSMISOR EN EL CEREBRO
      - Activa
        - Estimula enormemente la producción de leche del útero, aumentando las contracciones, al mes
- OVARIO
  - Se libera
    - TRAS LA DISTENSIÓN DEL CÉRVIX UTERINO Y LA VAGINA DURANTE EL PARTO

FUNCIÓN DE LA RELAXINA

ES UN

polipéptido producido por el cuerpo lúteo del ovario durante la preñez

PRINCIPAL FUNCION

- Dilatación del cérvix y vagina antes del parto.
- Inhibición de las contracciones miometriales.
- Mejora la motilidad del esperma en el semen