Nombre del alumno: Marcos de Jesús Ruiz Cancino

Nombre Del docente: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Materia: Fisiología de la reproducción

Trabajo: mapa conceptual

grado y grupo: 3B

fecha: 06/07/24

PARTO

FASES DEL PARTO

UN

Parto se va dividir en 3 faces.

LAS

FACES SON:

Fase 1: Preparación (Preparto)
- Duración: 2-6 horas (aunque puede durar más en primerizas).
- Signos: Inquietud, levantarse y acostarse con frecuencia, levantamiento de la cola, secreción mucosa del canal cervical, y la ubre se llena de leche.

Fase 2: Expulsión del Feto
- Duración: 30 minutos a 2 horas (más larga en primerizas).
- Signos: Fuertes contracciones abdominales, la vaca empuja activamente, la aparición de la bolsa de agua (amnios), y finalmente la salida del ternero.

Fase 3: Expulsión de la Placenta
- Duración: Dentro de las 12 horas post-parto.

CUIDADOS DE LA MADRE Y DEL RECIEN NACIDO

EN LA

MADRE:

SON

Comprobar si ha sufrido desgarros o algún traumatismo en el canal del parto. Si tiene alguna lesión, deberá ser tratada por el veterinario.
•Mantenerla en un ambiente limpio y revisar que la ubre está limpia y libre de mastitis.
•Vigilar la expulsión de la placenta y los loquios para evitar el desarrollo de metritis.

EN LA

CRIA:

SON

Comprobar que respira sin dificultad y que no tiene obstrucciones en las vías aéreas.
•Si hubiera alguna situación que comprometa su salud o su supervivencia, hay que avisar al veterinario de inmediato.
•Limpiarlo y secarlo rápidamente para evitar la hipotermia, frotando vigorosamente con paja limpia, que lo estimula y pone en pie.
•Desinfectar el ombligo con una solución yodada, evitando así las infecciones.

PUERPERIO

ES

El período post-parto durante el cual el aparato reproductor de la vaca regresa a su estado normal, preparándose para una nueva concepción.

EL

Puerperio es donde se lleva a cabo la regeneración uterina, ocurre en el centro del ciclo reproductivo, después de la gestación o alternativamente del Anestro.

RETENCIÓN PLACENTARIA

LA

Retención Placentaria favorece la aparición de infecciones uterinas después del parto provoca disminución de la producción de leche y aumenta el riesgo de desarrollar procesos infecciosos como metritis y endometritis.

ALGUNAS CAUSAS

SON

Desnutrición
•Partos prematuros
•Abortos
•Cesáreas
•Deficiencia de minerales y vitaminas
•Trastornos hormonales
•Enfermedades infecciosas
•Complicaciones al momento del parto

DISTOCIA

ES

La dificultad del parto o su imposibilidad por obstrucción, esto puede deberse a causas fetales, maternas o mecánicas.

LAS CAUSAS COMNUNES

SON

•Estática fetal.
•Presentación, actitud y comportamiento anormal.
•Talla del feto.
•De acuerdo al diámetro del canal pélvico normal.
•Dilatación insuficiente o negativa de la cérvix

RESOLUCIÓN DE LA DISTOCIA

SE

Aplican diversas maniobras obstétricas para la resolución de las distocias, preservando durante las mismas la salud y la vida de la madre y en lo posible del feto.

ESTAS SON:

LA

1. Episiotomía
2. Mutación
3. Extracción forzada
4. Fetotomía
5. Cesárea

CÉRVIX.

EL

Cérvix es un órgano tubular que separa al útero de la vagina. Durante el estro se abre y secreta moco (moco estral) y durante el diestro permanece cerrado.

EN

La vaca gestante el cérvix produce un tapón que evita el paso de partículas y agentes infecciosos al útero.

EL

Conducto que forma el cérvix se conoce como canal cervical y está limitado por dos orificios (os interna y os externa).

ANOMALÍAS DEL CERVIX

ALTERACIONES DEL CÉRVIX, CERVICITIS

LA

Cervicitis es un proceso inflamatorio del cuello del útero que puede ser provocado por varios factores, como pueden ser laceraciones de origen traumático debido a malos manejos durante las interrupciones de preñez o partos.

ALGUNAS CONCECUENCIAS POR ANOMALIAS:

SON

Piometras.
•Endometritis.
•Metritis.
•Cérvix roto.
•Cérvix doble.
•Infertilidad.
•Prolapso uterinos.
•Quistes ováricos.

FUNCIÓN DE LA OXITOCINA.

ES

Una hormona producida por la hipófisis cuya función principal es provocar las contracciones del útero en el momento del parto, aumentando la dilatación del cuello uterino.

TAMBIEN

Está indicada para la inducción del parto, inercia o atonía uterina, expulsión de placenta y restos de exudados tras el parto, iniciación a la lactancia tras el parto.

FUNCIÓN DE LA RELAXINA.

ES UN

Polipéptido producido por el cuerpo lúteo del ovario durante la preñez. En algunas especies también por la placenta y el útero.

ACCION:

1. La relaxina ensancha el hueso púbico y facilita el parto.
2. También suaviza la cérvix (maduración cervical), y relaja la musculatura uterina.
3. Mejora la motilidad del esperma en el semen.