



NOMBRE DEL DOCENTE: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

NOMBRE DE LA ALUMNA: Andrea Guadalupe Gómez Moreno

NOMBRE DE LA MATERIA: Zootecnia de puercos

NOMBRE DEL TRABAJO: Mapa conceptual

CUATRIMESTRE: 6

GRUPO: "A"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 06 DE JULIO DE 2024

MANEJO

Sistema de identificadores en cerdos

Tatuajes: Consiste en la marca indeleble. Deben hacerlas personas capacitadas para que no se deforme con el crecimiento de la oreja

Caravanas o chapas metálicas: Con numeración grabada. Su aplicación es rápida y sencilla

Marcados de fuego Se utiliza cuando se necesita identificar al cerdo por pocos días

Muecas: El señalamiento de los cerdos se realiza muescando las orejas con alicates especiales

Manejo en la reproducción

Para dar cría a la hembra debe ser cubierta,

Para hacer copula con el macho en la época de celo o calor, se reconoce cuando está inquieta monta sus compañeros, busca el macho

Cuando esta en este estado debe llevarse al puesto de monta y dejarlos tranquilos, el acoplamiento o unión durante un buen número de minutos

Para asegurar la fecundación pasadas 10 horas del acoplamiento, debe volverse a llevar a la hembra a la celda del reproductor

Manejo de la gestación

La gestación de la cerda tiene una duración aproximada de entre 112 - 115 días

Es importante proporcionarles comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos

Las hembras deben disponer en todo momento de agua limpia y fresca para consumo a voluntad

La práctica más adecuada para manejar cerdas en gestación es el uso de comederos individuales

Manejo en el parto

Veinte días antes de la fecha de que se espera el parto, las cerdas deben permanecer en corrales cerca de las salas de partos y proporcionarles la comida necesaria.

Después del parto con frecuencia debe cambiarse la cama retirar de la camada los lechones que vayan muriendo y dejar el número de lechones igual a las tetas que den leche

Para evitar que aplaste a las crías, se le confinara en la jaula criadora que tiene 60 cm de ancho y dos metros de largo

Manejo en el lechón recién nacido

Los recién nacidos son muy sensibles al frío por lo tanto hay que darles abrigo, evitar que reciban corrientes de aire

Al segundo día de nacidos se cortan los colmillos y se aprovecha esta operación para pesarlos

Los cerditos deben ser castrados entre los 15 y 30 días

A los 7 días de nacidos deben ser vacunados y hacer a la vez un examen de ombligo y de rabo para ver si están infectados

Descolmado

Los lechones nacen con dientes caninos afilados en las esquinas de los maxilares superior e inferior

Estos dientes pueden traumatizar las ubres de la cerda, esta se puede negar a amamantar

El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento, hasta que los lechones hayan ingerido cantidades suficientes de calostro

Muerte neonatal

La mortalidad neonatal de lechones es un problema económico y de bienestar animal importante

Las muertes ocurren principalmente durante las primeras 48 horas después del parto siendo el aplastamiento por la cerda la

Factores causantes de la muerte neonatal: Aplastamiento, desnutrición, Hipotermia, y las enfermedades

Manejo en la lactancia

Un amamantamiento dura entre 2 y 3 minutos, mientras que la eyección de leche se completa en 10 - 20 segundos

Los lechones de una misma camada maman simultáneamente cada 30 a 70 minutos y hasta 20 veces al día