



Mi Universidad


YULENI ANTONIA MORALES AGUILAR

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

6B

TRABAJO PLATAFORMA

Porcinos



Alimentación

La alimentación de los cerdos es una de las prácticas más importantes en la porcicultura, ya que de ella dependen el estado de los animales, su crecimiento y la rentabilidad de la granja, ya que la alimentación representa 80 a 85% de los costos de producción.

Agua

- El cerdo también necesita tener acceso al agua dulce las 24 horas del día. El cerdo promedio bebe 3 galones de agua (11 litros) cada día.
- Un cerdo en la fase de cebo consume de 2,2 a 2,8 litros de agua por kg de materia seca ingerida, mientras que un lechón ingiere de 3 a 3,5 veces más de agua que de pienso.
- Respecto a las cerdas reproductoras son mucho más exigentes, especialmente si están en lactación, siendo su consumo medio de 4 a 4,5 l/kg MS.

Alimentación en gestación.

- Para el buen rendimiento de los lechones y de la cerda en partos posteriores, es necesario garantizar una alimentación adecuada durante la gestación.
- Sobre este punto es necesario resaltar que tanto la subalimentación como la sobrealimentación afectan negativamente durante este período, así que debes tener mucho cuidado con la cantidad de alimento.
- La cantidad de alimento requerida por la cerda depende de la etapa de gestación en la que se encuentre la cerda.

Alimentación en lechones.

- Se opta por emplear la alimentación progresiva lo antes posible, es un medio para pasar del consumo total de leche a sólidos sin resultar estresante para los lechones.
- La alimentación progresiva puede empezar a implementarse a partir de los 12 días de vida de los lechones.

Alimentación en crecimiento y engorda.

- En esta etapa es fundamental centrarse en la ingesta de alimentos, ya que las necesidades nutricionales cambian rápidamente.
- En esta fase los cerdos ya no necesitan dietas complejas, solo necesitan altos niveles de proteína (sobre todo para cerdos en crecimiento) que se pueden conseguir en la alfalfa, soya, moringa y más.
- Conforme se vaya acercando la finalización del cerdo (de 75 a 80 kilos de peso corporal) debes aumentar la cantidad de proteína en su dieta

1

Materias primas y subproductos

- Las fuentes de energía más utilizadas para la alimentación porcina son el maíz y el sorgo, y de proteína la harina de soya.
- Las vitaminas y minerales son fabricadas por empresas especializadas y se agregan a los alimentos en forma de premezclas.

Alimentación de reproductores.

- Durante la primera parte de la gestación el alimento puede ser igual que el suministrado a los verracos.
- Durante las últimas cuatro semanas su alimentación debe reforzarse con alguna fuente de proteínas, aumentando la ración de 1,5 kg a 3 kg por día.

Alimentación en lactancia.

- Se debe permitir a las cerdas que consuman si son primerizas de 5,5 a 6 kg por día y si son adultas de 6 a 7 kg por día.
- Este total de alimento debe ser repartido de 4 a 6 veces por día y en zonas calientes darlo a las horas más frescas y durante la noche.
- Cuando la cerda tiene menos de 8 lechones se debe dar 2 kg a ella y 0,5 kg por lechón.

Alimentación en destetados.

- En la vida de un cerdo, el destete resulta el período más estresante, por lo que hay que alterar su dieta lo menos posible, ya que cualquier cambio brusco reducirá su rendimiento a largo plazo.
- Para la alimentación de lechones después del destete, ofrece la misma dieta que suministrabas antes del destete por al menos una semana más o hasta que pese 9-10 kg.

7

8

9

