

UDS

- Alumna: Paola Elizabeth Maldonado Cancino
- Profesor: MVz. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
- Materia: Zootecnia en porcinos
- Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia
- Cuatrimestre 6to
- Parcial :3

Manejo

Sistemas de identificadores en cerdos

Son

- Tatuajes
- Caravanas o chapas metálicas
- Marcado o fuego
- Marcado a frío
- Muesca

Manejo en la reproducción.

Se

Debe llevarse al puesto de monta y dejarlos tranquilos, el acoplamiento o unión durante un buen número de minutos debido a la eyaculación lenta del semen.

y

Para asegurar la fecundación pasadas 10 horas del acoplamiento, debe volverse a llevar a la hembra a la celda del reproductor.

Manejo en la gestación

Se

Mantiene a la cerda estabulada en corrales con piso de concreto o jaulas alternado con potreros con buen pasto.

y

Es importante proporcionarles comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos.

y

La práctica más adecuada para manejar cerdas en gestación es el uso de comederos individuales.

Manejo en el parto

Antes del parto

Veinte días antes de la fecha de que se espera el parto, las cerdas deben permanecer en corrales cerca de las salas de partos y proporcionales la comida necesaria tendrán preparadas las celdas para las parturientas, corrales individuales de 2,50 a 3m mas un compartimento de un 1m cuadrado destinado a la manada.

Después del parto

Después del parto con frecuencia debe cambiarse la cama retirar de la camada los lechones que vayan muriendo y dejar el número de lechones igual a las tetas que den leche. Si hay otras lactantes con tetas libres se les pueden pasar los lechones

Manejo en el lechón recién nacido.

En

Los recién nacidos son muy sensibles al frío por lo tanto hay que darles abrigo, evitar que reciban corrientes de aire y proporcionarles calor en forma natural o artificial.

y

Al segundo día de nacidos se cortan los colmillos y se aprovecha esta operación para pesarlos, el promedio de peso de cada uno debe ser un kilo.

y

•Se procede a marcar las orejas y abriendo su respectiva tarjeta de pedigrí. Las orejas se marcan haciendo cortes con las tijeras, perforaciones o muescas.

Descolmillado

los

Lechones nacen con dientes caninos afilados en las esquinas de los maxilares superior e inferior.

y

El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento, hasta que los lechones hayan ingerido cantidades suficientes de calostro. Esto para evitar infecciones.

Muerte neonatal.

La

Mortalidad neonatal de lechones es el resultado de un conjunto de interacciones complejas entre la cerda, los lechones y el ambiente, de forma que identificar una causa única resulta a menudo muy difícil.

Causas

- Aplastamiento
- Desnutrición
- Hipotermia
- Enfermedades
- Otras causas, cerdas agresivas o producción de leche insuficiente

Manejo en la lactancia.

El

Amamantamiento dura entre 2 y 3 minutos, mientras que la eyeción de leche se completa en 10 - 20 segundos. Los lechones de una misma camada maman simultáneamente cada 30 a 70 minutos y hasta 20 veces al día.

Fases

Fase 1. Los lechones compiten para conseguir el acceso a la ubre
Fase 2. Mesajear la ubre rítmicamente
fase 3. Estimular la liberación de oxitocina, y succión de leche
fase 4. Eyección de leche, frecuencia de los gruñidos
Fase 5. Lechones masajean la ubre y realizan movimiento de succión lentos. Disminuye los gruñidos de la cerda