

Nombre de alumno:
Yazmin Lucero Gutierrez Sanchez

Nombre del profesor:
MVZ. Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo:
Mapa conceptual



Materia:
Zootecnia en Porcinos

Grado:
6

Grupo:
B

MANEJO

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN EN CERDOS

Tatuajes: Consiste en marca indeleble.

Chapas metálicas: Con numeración grabada.

Marcado a fuego: Se ha ensayado en distintas regiones del cuerpo.

Marcado a frío: No da resultado positivo en los porcinos.

Muecscas: El señalamiento de los cerdos se realiza muecscando las orejas con alicates especiales.

MANEJO EN LA REPRODUCCIÓN

Para dar cría a la hembra debe ser cubierta (servida). Para hacer copula con el macho en la época de celo o calor, se reconoce cuando esta inquieta monta sus compañeros.

Para asegurar la fecundación pasadas 10 horas del acoplamiento, debe volverse a llevar a la hembra a la celda del reproductor.

MANEJO EN LA GESTACIÓN

La gestación de la cerda tiene una duración aproximada de entre 112 - 115 días. Es importante proporcionarles comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes

Las hembras deben disponer en todo momento de agua limpia y fresca para consumo a voluntad.



•La práctica más adecuada para manejar cerdas en gestación es el uso de comederos individuales.

MANEJO EN EL PARTO

Antes del parto: Veinte días antes de la fecha de que se espera el parto, las cerdas deben permanecer en corrales.

Después del parto: Debe cambiarse la cama retirar de la camada los lechones que vayan muriendo.

Consideraciones: Para evitar que aplaste a las crías, se le confinara en la jaula criadora que tiene 60 cm de ancho y dos metros de largo



MANEJO

MANEJO DEL LECHÓN RECIÉN NACIDO

Los recién nacidos son muy sensibles al frío por lo tanto hay que darles abrigo. Al segundo día de nacidos se cortan los colmillos y se aprovecha esta operación para pesarlos

Los cerditos deben ser castrados entre los 15 y 30 días. Se procede a marcar las orejas y abriendo su respectiva tarjeta de pedigrí. A los 7 días de nacidos deben ser vacunados

DESCOLMILLADO

Los lechones nacen con dientes caninos, estos dientes pueden traumatizar las ubres de la cerda, esta se puede negar a amamantar si ha sufrido lesiones de este tipo.

El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento, hasta que los lechones hayan ingerido cantidades suficientes de calostro. Esto para evitar infecciones.

MUERTE NEONATAL

La mortalidad neonatal de lechones es un problema económico y de bienestar animal importante. Las muertes ocurren principalmente durante las primeras 48 horas después del parto.

Aspectos de muerte neonatal:

- Aplastamiento
- Desnutrición
- Hipotermia
- Enfermedad.

MANEJO EN LA LACTANCIA

Un amamantamiento dura entre 2 y 3 minutos, mientras que la eyección de leche se completa en 10 - 20 segundos.

Un amamantamiento incluye cinco fases distintas:

- **Fase 1:** Los lechones compiten para conseguir el acceso a la ubre
- **Fase 2:** Masajear la ubre rítmicamente
- Fase 3:** Estimular la liberación de oxitócica de la madre
- Fase 4:** consiste en la eyección de leche.
- Fase 5:** Ocurre después de la eyección, los lechones masajean la ubre.

