



# ZOOTECNIA EN CERDOS

Hugo  
Mora Cano

6 - B



Profe  
Gonzalo  
Rodríguez



# Sistemas de Identificadores en Cerdos

Son aquellos instrumentos que permanecen durante toda la vida del animal para el uso controlado de registros, inclusive para distinguir la canal después de haber sido sacrificado.

Se pueden dividir en 2:

- Los que utilizan la progenie (línea de producción)
- Los que utilizan los cerdos reproductores (hembras y sementales)

## Manejo en la reproducción.

El manejo de la hembra durante el celo, la gestación, el parto, la lactación y el destete es la clave del éxito reproductivo, no solo para obtener una camada numerosa sino también homogénea en peso y en calidad al destete.

## Manejo en el lechón recién nacido

Se debe asegurar que respiren al nacer, tomen calostro en las primeras horas de vida y se evite la infección del ombligo por la posibilidad de enfermedades o hernia.

## Manejo en la gestación

El tiempo de gestación de los cerdos dura entre 110 y 120 días, con un promedio de 114 días (3 meses, 3 semanas y 3 días). Se recomienda que la cerda gestante esté en CC3 y que los dos primeros tercios de la gestación (día 0 a 75) se alimente con 3.5 kg de alimento balanceado. Para el último tercio de gestación (últimos 45 días) se recomienda aumentar el alimento a 4.5 a 5 kg para favorecer el desarrollo fetal.

## Descolmillado

El descolmillado se puede realizar al mismo tiempo que se hacen las tareas de marcación en las orejas y recorte de la cola.

## Manejo en el parto

Mantener los comederos aseados, sin alimento rancio. Quitar el alimento sobrante antes de servir el nuevo. Dar alimento húmedo, o usar comederos con bebedero integrado.

## Manejo en el parto

Un flujo mínimo de 2L por minuto en los bebederos de Tetina. Se debe reducir el alimento 3 días antes del parto. El día del parto solo ofrecer agua y preferiblemente nada de alimento. En el parto es necesario asistir a la cerda tomando en cuenta medidas como lavado y desinfección de manos, o el uso de guantes estériles.

## Muerte neonatal

El término neonatal se utiliza para los lechones a las primeras cuatro semanas de vida. La principal causa no infecciosa de mortalidad en lechones es, con mucho, el aplastamiento por la madre