



Mi Universidad

Cuadro sinoptico

Nombre del Alumno Daniela Yamile Domínguez Pérez

Nombre del tema

Parcial 2

Nombre de la Materia Producción sustentable de huevo

Nombre del profesor Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre de la Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre 9

Producción de huevo sustentable

Despique en Gallina ponedora

1. Evitar Canibalismo o el picoteo de pluma en las aves.
2. Evitar que las aves desperdicien alimentos y maximizar el consumo.
3. Evitar que las gallinas rompan el Huevo al momento de la postura.

- El despique se realiza como un corte a mitad del pico, entre la punta y los orificios nasales. Se debe realizar de una manera óptima para evitar que el ave sufra y tenga un total cierre de su postura.
- El tiempo adecuado para la cauterización debe ser entre 3 a 4 segundos, si se excede de ese tiempo el ave puede sufrir daños cerebrales y quedar inservible.

Problemas de un mal despique

Hoy en día hay estudios que indican que esta práctica no genera ningún tipo de dolor al ave, siempre y cuando se haga de manera correcta, caso contrario a cuando se hace una exposición bastante prolongada del ave en lo que es la cortadora que se utiliza para el despique, pudiendo ocasionar lesiones leves en el ave que le van dificultar posteriormente el proceso de alimentación.

Selección de terreno

Los sistemas productivos donde se alojan las aves pueden ser de tres tipos.

1. El primer tipo se denomina **producción intensiva**, donde las aves permanecen alojadas en jaulas y están cubiertas todo el tiempo.
2. El segundo tipo se denomina **producción semi-intensiva**, donde los animales cuentan con un área al aire libre y otra con cubierta.
3. El tercer tipo se denomina **producción extensiva**, este sistema se refiere al ambiente al aire libre donde las aves pasan parte de su tiempo.

En galera

De preferencia, debe contar por lo menos con un módulo compuesto por una galera para iniciación-desarrollo y dos galeras para producción, esto permitirá tener continuidad en el negocio.

En cada módulo la galera para iniciación-desarrollo debe estar situada por lo menos a 150 metros de distancia de las galeras de producción y situada de tal manera que los vientos predominantes en la zona, soplen hacia las galeras de postura y no al contrario.

Alojamiento

El tipo de alojamiento de la pollita y de la gallina puede ser de dos tipos:

- Alojadas en Piso: temperamento "tranquilo".
- Alojadas en Jaula – temperamento "nervioso" en las criadas en jaula.