Nombre: Andrik Edelvani Villatoro Ayala

Nombre del Tema: cuadro sinóptico

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Producción de huevo

Nombre del Profesor: Gonzalo Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: Noveno

- Despique en gallina ponedora
  - Es el corte de los picos de los pollos, se da por tres razones principales
    - Evitar canibalismo
    - Evitar que las aves desperdicien alimento
    - Evitar que las gallinas rompan el huevo al momento de la postura
  - Existen dos tipos de despique que se le realiza al ave antes de la primera postura
    - El primero de 8 a 12 días
    - El segundo de 10 a 12 semanas cuando ya son adultas

- Despique moderado
  - Se realiza como un corte a la mitad del pico, entre la punta y los orificios nasales, se debe de realizar de manera óptima para evitar que el ave sufra y tenga un cierre total de postura
  - El tiempo adecuado para la cauterización debe ser entre 3 a 4 segundos, si se excede de ese tiempo el ave puede sufrir daños cerebrales y quedar inservible

- Problemas de un mal despique
  - Hoy en día hay estudios que indican que esta práctica no genera ningún tipo de dolor al ave, siempre y cuando se haga de manera correcta
  - Si se hace de una manera inadecuada puede ocasionar lesiones leves en el ave que le van a dificultar posteriormente el proceso de alimentación

- En galera
  - De preferencia debe contar por lo menos con un módulo compuesto por una galera para iniciación, desarrollo y dos galeras para producción
    - Características
      - Las galeras deben tener por lo menos 10 metros de distancia entre ellas
      - Galeras frescas y ventiladas por lo que hay que saber seleccionar materiales con estas características
      - Deberán contar con una altura máxima de 5 metros

- Alojamiento
  - El tipo de alojamiento de la pollita y de la gallina pueden ser de dos tipos
    - Alojadas en piso
      - Temperamento tranquilo
    - Alojadas en jaula
      - Temperamento nervioso