U D S

UNIDAD II CUADRO SINÓPTICO

LIC.EN NUTRICIÓN

PROFA: Daniela Guillen
Alumna: María José Ruiz Meza

Noveno cuatrimestre

CUIDADOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL.

- **APOYO NUTRICIONAL**
  - SE EFECTUA ATRAVEZ DEL TUBO DIGESTIVO
  - SE EFECTUA POR VIA ENDOVENOSA
  - LA NUTRICION ENTERAL
    - CONSITE EN ADMINISTRAR ALIMENTOS
      - POR VIA DIGESTIVA
    - EL MODO DE NUTRIR UN PACIENTE
    - ALIMENTACION POR SONDA
      - HACE REFERENCIA A UM SISTEMA DE ADMINISTRACION
- **CARACTERISTICAS DE ALIMENTOS DE DIETA ENTERAL**
  - LIQUIDOS
  - HOMOGENEOS
  - SIN GRUMOS
  - CON UN GRADO DE VISCOSIDAD
- **ALIMENTOS CONVENCIONALES APTOS PARA LAS DIETAS POR SONDA**
  - FUENTES DE HIDRATOS DE CARBONO
    - SACAROSA
    - HARINA DEXTRINOMALTEADAS
    - OLIGOSACARIDOS
  - FUETES DE PROTEINAS
    - CARNES, PESCADOS HOMOGENEIZADOS
    - LECHE DESNATADA
    - PROTEINA EN POLVO COMERCIAL
  - LIPIDOS
    - ACEITE DE OLIVA O SEMILLAS
  - VITAMINAS Y ELEMNTOS QUIMICOS ESENCIALES
- **TIPOS DE SONDA**
  - NASO GASTRICA
    - La vía de entrada es uno de los orificios nasales, desde donde se hace progresar la sonda hasta la cavidad gástrica.
  - NASO- GASTRO-DUODENAL Y GASTRO-YEYUNAL
    - Es una variedad de la anterior en la que el extremo distal queda situado en el interior del duodeno o del yeyuno.
  - Sonda de gastrostomía
    - La sonda se introduce en la cavidad gástrica a través de una incisión quirúrgica de la pared abdominal.
  - yeyunostomía
    - Es un método muy utilizado para nutrir al enfermo tras ciertas intervenciones quirúrgicas.
  - Faringostomia, esofagostomia
    - Métodos poco utilizados, en los que la sonda se introduce, tras la correspondiente incisión y disección cervical o supraclavicular, a través de la faringe o el esófago, hasta llegar al estómago.
- **ALIMENTACIÓN PARENTERAL**
  - La nutrición parenteral (np) se llama total (npt) si proporciona la totalidad de la energía y de los nutrientes requeridos, y parcial o hipocalórica si sólo lo hace en parte.
    - reducir su mortalidad o complicaciones
    - pacientes cuya patología no permitita la nutrición endo digestiva
  - Indicaciones de la nutrición parenteral
    - ·fistulas digestivas proximales.
    - – pancreatitis aguda.
    - – sindrome de intestino corto.
    - – peritonitis.
    - – enfermedad inflamatoria intestinal (en fases de brote importante).
    - – cirugía digestiva.
    - – oncología (irradiación, quimioterapia).
  - NUTRIENTES HIDROLIZADOS
    - DOSISMAYORES PUEDEN OCASIONAR GRASA EN EL HIGADO
  - Fuentes de lipidos
    - Se dispone de emulsiones lipídicas aptas para ser administradas por vía endovenosa
- **COMPLICACIONES**
  - MECANICAS
    - Están en estrecha relación con el catéter, que puede perforar diversas estructuras
  - METABOLICAS
    - Se relacionan, principalmente, con la cantidad de agua y electrólitos (exceso o defecto), la osmolaridad elevada (una entrada rápida es sumamente grave) y la glucosa infundida (hiperglucemia)
  - SEPTICAS
    - Son temibles, y pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente. Son debidas a la contaminación del líquido nutritivo, o de las vías de administración o de las conexiones.
- **OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA**
  - El objetivo primordial de la unidad será contribuir a recuperar o mantener un aceptable estado de salud, en el menor tiempo posible y a los costos más aceptables

Presented with xmind