



**Mi Universidad**

## **Mapa conceptual**

*Nombre del Alumno: Leidy Mariana Velasco García*

*Nombre del tema: Principales enfermedades congénitas del recién nacido*

*Parcial: 3er parcial*

*Nombre de la Materia: Morfología y función*

*Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 3er Cuatrimestre*

## PRINCIPALES MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL RECIEN NACIDO

### LABIO LEPORINO

Este defecto consiste en que, el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente. Esto sucede en los primeros meses de embarazo en algunos casos se debe a una combinación de genes.

### ANENCEFALIA

Aparece a comienzos del desarrollo del feto y consiste en la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo

### ESPÍNA BÍFIDA

Se produce cuando no se cierra por completo el tubo de la columna vertebral del feto durante el primer mes del embarazo, lo que puede dañar los nervios o la médula espinal

### ANOFTALMÍA O MICROFTALMIA

El resultado de estas dos enfermedades es la ceguera o la visión limitada. En algunos casos esto se debe a un cambio en los genes o cromosomas del feto

### HIDROCEFALIA

Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro

### ENCEFALOCELE

Es un defecto de nacimiento raro del tubo neural y afecta al encéfalo. La afección tiene un componente genético aunque también puede producirse por exposición ambiental antes o durante el embarazo

## ATRESIA DE RECTO

Consiste en un desarrollo anormal del feto por el cual hay una falta u obstrucción de la abertura hacia el año. Se desconocen las causas y no se conoce ninguna forma de prevención.

## HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA

Es un defecto congénito que ocurre cuando el diafragma, que tiene forma de membrana y separa el abdomen del tórax, no se forma completamente.

# PRINCIPALES MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL RECIEN NACIDO

## AGENESIA RENAL BILATERAL

Es un defecto congénito que afecta a los tubos renales causando la ausencia del desarrollo de ambos riñones y de los uréteres en el feto.

## ATRESIA DEL ESÓFAGO

Es una anomalía que tiene lugar cuando la parte superior del esófago termina y no se conecta con su parte inferior ni con el estómago.