



Mi Universidad


Cuadro sinoptico

- **Nombre: Jose Aidn Espinoza Juarez**
Cuatrimestre: 6 Grupo: A
Materia: practica de enfermeria clinica
carrera: enfermeria en licenciatura

NOM. 055

para todo el personal
de los establecimientos
que hacen su
donación.

la sangre para fines de
transfusión se podrá obtener
por extracción venosa,
los componentes se obtendrá
por centrifugación.



**Requisitos
Generales.**



para garantizar la seguridad y la
calidad de las unidades de sangre
y componentes sanguíneos así como
la de servicios prestados, los bancos
de sangre y servicios de Transfusión.

sanguíneos para uso terapéutico deberán reunir los requisitos de calidad necesarios a fin que resulten eficaces o no farmacológicos.
seguridad y calidad de las unidades de sangre y los componentes sanguíneos así como la de servicios prestados o los bancos de sangre
de la distinción de sangre y los componentes sanguíneos deberán registrarse de forma que permita garantizar trazabilidad
en países de suministro y los servicios de transfusión deberán ser implementado presentación por educación

que extraído
a ser de
de la sm
del donante
sanguíneos
estilos

Tiempo de la
donación:

El tiempo de
llenado de una
unidad deberá
ser de 8 a 12
minutos y se
deberá rotificar
por escrito el riesgo
de procedimiento

Máximo de las
extracciones por
año:

- 4 veces en un varón
- 3 veces en una mujer
- los intervalos mínimos entre extracciones serán de:
 - 8 semanas
 - 3 meses
 - 4 semanas

Tiempo de los
donadores:

- * voluntario y altruista.
- * Tomar o de resecación
- * desgranado
- * dirigido.
- * regular o de la resecación.



uso pleto de sus facultades mentales y papeles convalidados del ejercicio

hombres de 18 años y los mujeres de 16 años.
de 50 kg. tolerancia de los donantes de eritrocitos de más de una unidad
cardíaca igual o menor a 50 latidos por minuto al menos que sean atletas.
presión arterial de 160 mm/Hg o mayor a la sistólica y de 100 mm/Hg o mayor para diastólica.
temperatura oral mayor de 37°C o oral mayor de 37.5°C

eritrocitos
concentrada por el virus de la hepatitis B
transmitir el virus B o C de la hepatitis
con transmitir el agente causal de la Tripanosomiasis.



NOM: Oficial Mexicana NOM: 253-SSA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

NOM: 253-SSA1-2012

Objetivo

Tiene como objetivos principales establecer las actividades, criterios o las estrategias y técnicas operativas del sistema nacional de salud en la relación con la disposición de sangre humana, y sus componentes con fines terapéuticos, o, más bien, con los fines de cooperación, entre otros.

Selección del donante.

- **Indice de exclusión definitiva.**
- las personas que no estén en uso pleno de sus facultades mentales y padezcan alteraciones del alrecesio
- las personas menores de 18 años y los hombres de 65 años.
- las personas que pesen menos de 50 kg, hollándose de los donantes de ereoliforocesis de más de una unidad
- personas que tengan frecuencia cardiaca igual o menor a 50 latidos por minuto al menos que sean adultos.
- personas que tengan presión arterial de 180 mm/Hg o mayor a la sistólica y de 100 mm/Hg o mayor a la diastólica.
- personas que tengan temperatura axilar mayor de 37°C o oral mayor de 37.5°C
- **Indice de exclusión permanente.**
- personas que tengan infección comprobada por el virus humano inmunodeficiencia humana.
- personas que pudieran transmitir el virus BOC de la hepatitis
- personas que pudieran transmitir el agente causal de la Tripanosomiasis.

donación permitida

el volumen máximo de sangre extraído en cada ocasión deberá ser de 450 ml - 10% N° deberá exceder de 10,5 ml por kg de peso corporal del donante o del 13% de su volumen sanguíneo calculando e incluyendo mastos sanguíneos.

disposiciones generales.

- la sangre y componentes sanguíneos para uso terapéutico deberán recibir los requisitos de calidad para garantizar la seguridad y calidad de los unidades de sangre y los componentes sanguíneos
- todas actividades relativas a la distribución de sangre y los componentes sanguíneos deberán ser puestas de acuerdo y los servicios de trasfusión deberán
- los bancos de sangre son puestos de saneado y los servicios de trasfusión deberán

campo de aplicación.

esta norma de observación para todo el personal profesional, técnico y auxiliar de los establecimientos públicos sociales y culturales que hacen su disposición de sangre humana.

la sangre para fines de trasfusión se podrá obtener por extracción venosa, los componentes se obtendrán por centrifugación.

Tiempo de la donación.

el tiempo de llenado de una unidad deberá ser de 8 a 12 minutos y se deberá notificar por es efecto el área de procedimiento

Máximo de las extracciones por año.

- 4 veces en un varón
- 3 veces en una mujer
- los intervalos mínimos entre extracciones serán de:
 - 8 semanas
 - 3 meses
 - 4 semanas.

Tiempo de los donantes.

Requisitos generales