



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Michell Guillen Soto

Nombre del tema: Alteraciones del esófago.

Parcial: I.

Nombre de la Materia: Medico Quirúrgica I I

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: enfermería.

Cuatrimestre: 6

ALTERACIONES DEL ESÓFAGO

Definición

Presencia de lesiones o estructuras anormales que aparecen en la pared esofágica y afectan el diámetro de la luz, dificultando el paso del bolo alimenticio, lo cual se manifiesta como disfagia.

Etiología

Su etiología es en ocasiones desconocida, aunque parece estar implicada la existencia de reflujo gastroesofágico.

Clasificación

- Anillos esofágicos
- Membranas esofágicas
- Divertículos
- Rotura esofágica

(Síndrome de Boerhaave si es espontánea).

Alteraciones del ESÓFAGO

Patologías

Peristalsis
Esofágica
Sintomática

Se producen ondas de gran amplitud que ocasionan importantes contracciones del esófago. Causa con dolor torácico y poca disfagia en el diagnóstico hay que descartar ERGE, pues el reflujo puede producir trastorno motor de forma secundaria.

Hipertonía del esfínter esofágico inferior

Trastorno motor donde se demuestra la existencia de una presión en reposo del EEI superior a 2 desviaciones estándar de la media manométricamente se describe como tono del EEI elevado y contracciones normales.
tono (35-40 mm Hg.)

Alteraciones del ESÓFAGO

Patologías

Divertículos Esofágicos

Son dilataciones circunscritas de la pared esofágica, únicas, tapizadas por mucosa y tejido conjuntivo el más frecuente es el Zenker se localiza en la región del triángulo de Killian. Existen 2 tipos epifrénico y Medio esofágico.

Hernia hiatal

Es una protracción del estómago a través del hiato diafragmático. La mayoría es asintomática pero la mayor incidencia de reflujo ácido puede provocar síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. se diagnostica por un estudio de deglución con bario.

Alteraciones del ESÓFAGO

Patologías

Esclerodermia.

Es una enfermedad autoinmune en la que existe una afectación esofágica hasta en un 80-90% de los casos. Produce esvemia de la vasa vasorum y atrofia del músculo liso. (Fibrosis) se manifiesta como pirosis, regurgitación ácida, puede complicarse con estenosis o desarrollo del esófago de Barrett.

Alteraciones del ESÓFAGO

Patologías

Acalasia

Es la alteración más frecuente, se produce una hipertonia del esfínter esofágico inferior, la causa es desconocida pero los pacientes presentan degeneración de neuronas inhibitorias que son responsables de la relajación del músculo liso y peristalsis.

Espasmo esofágico difuso.

Es el 2º más frecuente afecta a 45 años, se caracteriza por la presencia de ondas peristálticas simultáneas asociadas a ondas normales. cursa con dolor torácico y a menudo con disfagia que se desencadena por estrés.

Bibliografía

- Universidad del sureste. 2024. Antología Médico quirúrgico 2. Paginas (34 a 37). PDF.