



Nombre del alumno: Wendy Cárdenas Guillen

Nombre del tema: Resumen

Nombre de la Materia Medico Quirúrgica

Nombre del profesor: Cecilia Zamorano

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA.

Cuatrimestre: 6to Grupo: A

## GLAUCOMA



Es el aumento de presión de etiología muy diversa que cursa con alteración en el nervio óptico que queda reflejada en el estudio campímetro

- La etiopatogenia del glaucoma radica en la dificultad de salida del humor acuoso por el trabeculom y el tratamiento de la enfermedad está enfocado hacia la disminución de la producción del humor acuoso y en facilitar la salida de si mismo.
- la PIO esta determinada por la velocidad de produccion del humor acuoso en el epitelio del cuerpo ciliar y por la resistencia y la dificultad en su drenaje

## QUERATOCONJUNTIVITIS SICCA



Se define el ojo seco como una alteración en la película lagrimal que motivaría el daño en la superficie Inter palpebral ocular suficiente para producir molestias y disconfor ocular

Es muy importante averiguar si esta molestia de sequedad está asociada únicamente al ojo o es un problema más general, un síntoma de una enfermedad que puede ser más extensa y más grave

## ENFERMEDADES ALERGICAS OCULARES



Son uno de los problemas oftalmologicos mas frecuentes en todo el mundo y abarcan desde reacciones leves hasta moderadas como conjuntivitis, alergica estacional, o perenne hasta secreciones mucosas de la queratoconjuntivitis

- La conjuntivitis primaveral es habitualmente una inflamación bilateral que afecta principalmente a los adolescentes.
- La enfermedad es estacional y tiene un pico de actividad en los meses calurosos del año.
- la queratoconjuntivitis atópica representa un estado de hipersensibilidad adquirida por antígenos específicos



## INFECCIONES OCULARES

La mayoría de las infecciones oculares son producidas por bacterias y con menor frecuencia por virus, por el contrario, las infecciones por hongos son raras y en la mayoría de los casos son debidas a gérmenes oportunistas

Conjuntivitis es toda afección conjuntival originado por tanto microorganismo infeccioso por las causas inflamatorias de (alergias, toxinas, traumatismos, enfermedades sistémicas, etc)

Alteraciones oftalmológicas que requieran cirugía

## AMBLIOPIA

\* se caracteriza por la pérdida unilateral de la visión como resultado de una fijación exclusiva con el ojo dominante de modo prolongado y supresión de las imágenes en el ojo desviado

**Ambliopía por anisometropía:** ocurre en paciente con miopía unilateral intensa o con astigmatismo grave como resultado de recibir constantemente imagen borrosa de un objeto.

**Ambliopía por privación de estímulo:** Ocurre en un lactante que nace con una opacidad macular congénita ptosis unilateral, cicatriz corneal ptosis unilateral, cicatriz corneal, o catarata que impiden que la imagen visual adecuada alcance la retina

## ESTRABISMO

\*

Es la pérdida del paralelismo de los ejes visuales con alteración de la visión binocular, el estrabismo plantea diferentes problemas, la pérdida de la función binocular, la reducción de la visión del ojo desviado y el aspecto estético desfavorable

Para tener visión binocular es necesario que las imágenes percibidas en cada ojo sean semejantes en tamaño, forma, color, densidad, y equilibrio del sistema sensorial y motor sea perfecto.

## LACERACIONES CONJUNTIVALES

\*

La herida que afectan a la conjuntiva ocular produce dolor y sensación de cuerpo extraño tras un traumatismo ocular. a la exploración podemos observar una herida que deja ver la esclera blanca subyacente y que tiñe con fluoresceína

- Lo trataremos con pomada antibiótica de aureomicina cada 8 horas durante 4-7 días si la laceración es de gran tamaño 1cm o más debe suturarse en el quirófano, pero la mayoría se cura sin preparación quirúrgica

## RETINOBLASTOMA

\*

La edad de presentación es alrededor de 18 meses siendo raro su descubrimiento mas allá de los 7 años, el 6% es hereditario y se sospecha por leucocoria en 50-60%, estrabismos en 20% o signos evitativos en el segmento anterior. se observa una masa blanquecina que según su forma de crecimiento puede acompañarse de desprendimiento de retina o crecimiento endofítico.