



Mi Universidad

Cuadro sinoptico

Nombre: Jose Aidn Espinoza Juarez

Cuatrimestre: 6 Grupo: A

Nombre de la maestra: lic. Cesilia zamorano

Materia: practica de enfermeria clinica

carrera: enfermeria en licenciatura

Unidad 1

Jose A:dan Espinosa Juarez.

Cuadro Sinoptico

del Esófago.

Patología Estructural.

Presencia de lesiones o estructuras anormales que aparecen en la pared esofágica y afectan al diámetro de la luz dificultando el paso del tubo de alimentación.

Divertículos Esofágicos.

Concepto: Son dilataciones sacculares de la pared esofágica por mucosas.

Localización:

Tipos:

Esférico y medio esofágico. Incidencia en pacientes mayores de 50 años. Región del triángulo de Killian con la zona faríngea.

Síntomas:

Halitosis, regurgitación, cambios en la voz, dolor de retrosterno, pérdida de peso, aserción.

del Esófago.

Hernia Hiatal

Concepto: Presencia de una protracción variable de estómago a nivel intratorácico, desplazando en la cavidad torácica, atraves del diafragma.

Incidencia:

el 15% en los pacientes sometidos al estudio endoscópico esofágico.

Es Pasma Esofágico.

Trastorno motor más frecuente. Afecta a mayores de 50 años en sus ambos sexos.

Síntomas:

Esófago: ligeros y anemia ferrogénica.

Tratamiento:

Anticidantes de la bomba de protones y reparación quirúrgica.

Escleroderma

Enfermedad de la piel en un 80% se caracteriza del

"Es Pasma

ESOF

d:

"Perist

ESOF

"Il: por lo del ESTI

ESOF

Cuadro sinoptico ☺

arez.

de lesiones o estructuras anormales que aparecen en la pared esofagica y afectan al diametro de la luz dando el paso del lado de alimentacion

consejo: son debilitaciones secundarias de la pared esofagica por mucosas.

localizacion: { esofagico y medio esofagico. { Iradencia en pacientes mayores de 50 años.

Tipos: { region del triangulo de Killian con la zona faringea.

Sintomas: { halitosis, respiracion, cambios en la voz, dolor de retroest, perdida de peso, asercion.

Presencia de una proliferacion variable de estriado a nivel intratoracico, desplazando en la cavidad toracica, atravez del oxido.

el 15% en los pacientes sometidos al estudio endoscopico esofagico.

Es Pismo Esofagico.

Trastorno motor mas frecuente afecta a mayores de 50 años en sus ambos sexos.

Esofagitis crónica y anemia ferropénica

Inhibidores de la bomba de protones reparación op: rca: ca.

Esclerodermia

"Espasmo Esofagico difuso"

Es el segundo motor mas frecuente.



se caracteriza por la presencia de ondas peristalticas simultaneas. → causa con dolor Toracico.

"Peristalsis esofagica sintomatica"

en esta entidad se produce ondas de gran amplitud (sifosis).

→ EEI Normal

"Hipertonía del esfinter esofagico"

Trastorno de motor donde se encuentra de la existencia de una presión en reposo.

{ (en torno a 35-40 mmHg) Elevado/40 mmHg.

enfermedad al momento de existencia de la hipertension esofagica hasta en un 80-90% de los casos.

se caracteriza por distension del **2o tercio gastricoesofagico**

