



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Cecilia Gabriela Pérez Vázquez

Nombre del tema: mapa conceptual

Parcial: 3

Nombre de la Materia: patología del adulto

Nombre del profesora: Felipe Antonio morales

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6

Escalas de valoración funcional en el anciano

Escala de la cruz roja:

Se publicaron por primera vez en 1972 en el servicio de geriatría del hospital central

El evaluador debe clasificarse al paciente en el grado funcional que más se aproxime a su situación actual.

En cuanto a la validez la EFCR se asocia a mayor mortalidad y utilización de recursos sociosanitarios.

La escala de la cruz roja se acomoda por numeración de 0 a 5 de pende si es dependiente o independiente.

La escala de Lawton y Brody:

Fue publicada en 1969 y desarrollada en el Philadelphia Center Para evaluación

Una gran ventaja de esta escala es que permite estudiar y analizar no solo su puntuación global

Es muy sensible para detectar las primeras señales de deterioro del anciano

La escala de Brody se divide en 8

- Capacidad de utilizar el teléfono
- Hacer compras
- Preparación de la comida
- Cuidado de la casa
- Lavado de ropa
- Uso de medios de transporte
- Manejo de asuntos económicos

Escalas de valoración funcional en el anciano

Índice de Katz:

Fue creado en el año 1958, formado por enfermeras, médicos, trabajadores sociales, etc.

En el 1963 se publicó el artículo que le dio el nombre de Katz

Fue diseñado como índice de rehabilitación en la valoración de muchas enfermedades crónicas: infarto cerebral, artritis reumatoide

La escala se conforma por lavado, vestido, uso de retrete, movilización, continencia, alimentación.

Se valora si es independiente o dependiente

Se evalúa el grado de dependencia / independencia de las zonas utilizando seis funciones

Las funciones que valora tienen carácter jerárquico,

Concepto de independencia a una persona que no necesita ayuda o que utiliza ayuda mecánica

Inicialmente se realiza mediante la observación directa del paciente por el personal sanitario por dos semanas.

Índice de Barthel:

Diseñado en 1955 por Mahoney de sujetos con procesos neuromusculares

El cambio fundamental en el parámetro traslado de lado en silla de ruedas a cama

Los instrumentos de medición de las ABVD más utilizados en pacientes con enfermedad cerebrovascular

10 actividades básicas de la vida diaria:

- ❖ Comer
- ❖ Moverse de la silla
- ❖ Realizar el aseo personal
- ❖ Ir al retrete
- ❖ Bañarse
- ❖ Desplazarse
- ❖ Subir y bajar escaleras
- ❖ Vestirse
- ❖ Control urinario

En la escala Barthel se valoran por puntos de 15,10,5,0

Por ejemplo:

- ✓ Comer
- ✓ Vestirse
- ✓ Arreglarse
- ✓ Deposition
- ✓ Micción
- ✓ Ir al retrete
- ✓ Traslado al sillón-cama
- ✓ Deambulación
- ✓ Subir y bajar escaleras