



Nombre del Alumno: Erika Del Roció Martínez Hernández

Nombre del tema: unidad I

Parcial: primero

Nombre de la Materia: quirúrgica I I


Nombre del profesor: María Cecilia zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6"B"

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: A. PACIENTE CON: estreñimiento

	RESULTADO (NOC): EQUILIBRIO HÍDRICO	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTAJE DIARIO
<p>ED 0003 Riesgo de estreñimiento</p> <p><u>Paciente:</u> eliminación</p> <p><u>DEFINICIÓN:</u> ED riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia de defecación acompañada de eliminación difícil o difícilosa</p> <p><u>R/C:</u> Disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal</p> <ul style="list-style-type: none"> • ingesta insuficiente de fibras • malos hábitos alimentarios 	<p>0501 eliminación intestinal dominio 02: salud fisiológica</p> <p>Clase F: eliminación</p> <p>Formación y evacuación de heces</p>	<p>0501 Patrón de eliminación 0501 02 01 estreñimiento</p> <p>0501 02 01 no muscular para la evacuación fecal</p>	<p>1. gravemente comprometido</p> <p>2. sustancialmente comprometido</p> <p>3. moderadamente comprometido</p> <p>4. levemente comprometido</p> <p>5. no comprometido</p>	<p>2/3</p> <p>1/4</p> <p>2/3</p> <hr/> <p>5/10</p>

Prescrito


INTERVENCIÓN 0440 estreñimiento intestinal
Campo: Fisiológico: Básico
Clase B: control de la eliminación

ACTIVIDADES

- consultar al médico y al paciente y es factible al uso de supositorios
- Enseñar al paciente/familiar los principios de la educación intestinal
- instruir al paciente acerca de los alimentos con alto contenido de fibra
- asegurar una ingesta adecuada de líquidos
- administrar supositorios, según se precise

INTERVENCIÓN 0:

ACTIVIDADES

- evaluar el estado intestinal a intervalos regulares
- modificar el programa intestinal, si es necesario
- usar un supositorio de base cédula basado si en polietilenglicol, si lo tolera el paciente
- utilizar un enema de pequeño volumen, según sea necesario
- proporcionar alimentos ricos en fibra que hayan sido identificados por el paciente como medios de ayuda

Beusaido