

## **Mi Universidad**

*Nombre del alumno: Ana Belen Gómez Álvarez*

*Parcial: 2do parcial*

*Nombre de la materia: Patología del adulto*

*Nombre del profesor: María del Carmen López Silba*

*Nombre de la licenciatura: Lic. En Enfermería*

*Cuatrimestre: 6 "B"*

*Lugar y fecha: Comitán de Domínguez Chiapas, Junio de 2024*

# CÁNCER VESICAL

## CANCER VESICAL Y DERIVACIONES URINARIAS

El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada.

### DERIVACIONES URINARIAS

A veces, la vejiga se debe extraer o ya no podrá almacenar orina. En estos casos se requiere un tipo de derivación denominado derivación urinaria.

Las afecciones que pueden ocasionar una derivación urinaria son: Defectos congénitos, infecciones, tumores, otros bloqueos (que no se controlan mediante medidas conservadoras).

### CONDUCTO ILEAL

La orina ya no se almacena dentro del cuerpo. Fluirá continuamente en una bolsa aplicada a la piel. La bolsa se vaciará varias veces al día.

## ADENOMA O CANCER DE PROSTATA

El cáncer de próstata se forma en las células de la glándula prostática. Muchos cánceres de próstata crecen lentamente.

Siendo poco probable que se diseminen, pero algunos pueden crecer más rápidamente.

Se desconocen las causas exactas del cáncer de próstata y en sus primeras etapas no suele presentar síntomas.

El cáncer de próstata en su etapa inicial normalmente no presenta síntomas.

Los síntomas que pueden aparecer a medida que el cáncer progresa.

El diagnóstico del cáncer de próstata generalmente se basa en los resultados del examen clínico de la próstata y de un análisis de sangre en el que se verifican los niveles de una proteína llamada antígeno prostático específico.

## TALLA SUPRAPUBICA O VESICAL

### Procedimiento

Este procedimiento consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior.

La orina puede también ser evacuada mediante una sonda colocada en la vejiga por el canal de la uretra.




### Riesgos

Por lo general, un catéter suprapúbico se tolera muy bien.

Puede presentarse una hemorragia pasajera en la orina, la sonda puede provocar a veces una irritación de la pared de la vejiga.

Lo que puede traducirse en ganas de orinar o dolores de la vejiga y a veces emisión de orina por la uretra.

Los medicamentos pueden aliviar estos síntomas, pero a veces sólo en forma parcial, es necesario efectuar cuidados locales regulares a nivel del punto de entrada de la sonda en la piel.



# Bibliografía

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/16ee25b099a5c093ee45c714fb622b44-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf>