



Nombre de los alumnos: EDSON DANIEL DE LEON DOMINGUEZ.

Nombre del tema: PASOS PARA ATENDER UNA EMERGENCIA.

Nombre de la Materia PRACTICAS PROFECIONALES.

Nombre del profesor: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILVA.

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA.

Cuatrimestre: NOVENO Grupo: A

## PASOS PARA ATENDER UNA EMERGENCIA.

### SOLICITAR ATENCION.

La solicitud de atención de emergencia y urgencia médica deberá ser realizada por el brigadista de cada piso, o en su ausencia, por el primer respondiente.

### PRINCIPALES EMERGENCIAS.

Estas incluyen las infecciones obstétricas graves, las hemorragias del embarazo, parto y puerperio, las complicaciones graves de los estados hipertensivos del embarazo y un capítulo referido a la asistencia en caso de paro cardiorrespiratorio en la embarazada. Su abordaje adecuado puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto para la madre como el niño, siendo su impacto más significativo en los países con alta morbimortalidad materna.

La toma de la presión debe hacerse a la paciente con 20 minutos de reposo, sentada, con el brazo en un ángulo de 45 grados y a nivel del corazón. La tensión arterial sistólica corresponde a la aparición de los latidos.

Neurológico Síntomas de inminencia de eclampsia: fosfenos, cefalea, epigastralgia, visión borrosa u otras alteraciones cerebrales o visuales. Eclampsia. Respiratorio Edema pulmonar y cianosis, hematológico Trombocitopenia (menor de 150.000 por cc).

### VALORACION PRIMARIA.

Se entiende por valoración primaria a la actividad que ejecuta el brigadista o el responsable del inmueble, quien tiene conocimientos en primeros auxilios.

- A) Despejar vía aérea. Se hace un barrido en la cavidad bucal rápida con los dedos, con el fin de percatarse que no tenga ningún objeto que pueda obstaculizar la vía aérea superior.
- B) Respiración: En esta fase evaluación de la calidad de la respiración el ritmo y la dinámica de la oxigenación.
- C) Circulación: Si hay reperfusión hay circulación. Evaluación del ritmo bajo el siguiente criterio. Ritmo intensidad y amplitud del latido cardiaco.
- D) Déficit neurológico: Hace referencia al paso de la evaluación del estado de conciencia.

Hemoglobina aumentada en estados de hemoconcentración o disminuida en estados de hemólisis HELLP. Tiempo Parcial de Tromboplastina PTT, Razón Internacional Normalizada INR aumentado.

La preeclampsia severa es una emergencia hipertensiva, en especial, cuando se asocia a crisis hipertensiva con TAS > a 160 TAD > 110 mmHg y manifestaciones de encefalopatía hipertensiva o compromiso de órgano blanco.

### VALORACION SECUNDARIA.

Realizar una evaluación física de cabeza a pies: color de piel, si hay sudoración, frialdad, aumento de dolor, abdomen distendido.

1. Registrar los datos del paciente, signos vitales.
2. En caso de intoxicación realizar maniobras de Heimlich.
3. En caso de paro cardiorrespiratorio iniciar RCP, que consiste en una combinación de respiraciones y compresiones torácicas que dan un masaje cardiaco externo.
4. Realizar cuidados posteriores al paciente.

