

**Nombre de alumno: Edith Daniela  
Guillén Gordillo**

**Nombre del profesor: Flavio Daniel  
Morales Hernández**

**Nombre del trabajo: Mapa  
Conceptual**

**Materia: Psicopatología**

**Grado: 6to. Cuatrimestre**

**Grupo: "A"**

### TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesta de manifiesto por al menos tres de las siguientes circunstancias.

### MUTISMO SELECTIVO

- Fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar (p. ej., en la escuela) a pesar de hacerlo en otras situaciones.
- La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social.

### FOBIA ESPECÍFICA

- Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica (p.ej., volar, alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre).
- El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata.

### TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL

- Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales (p. ej., mantener una conversación, reunirse con personas extrañas), ser observado (p. ej., comiendo o bebiendo) y actuar delante de otras personas (p. ej., dar una charla).

### TRASTORNO DE PÁNICO

- Ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos.
- Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno mismo).
- Miedo a perder el control o de "volverse loco."
- Miedo a morir.

### TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS/ MEDICAMENTOS.

- Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico.
- Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de (1) y (2):
- 1. Síntomas del Criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento.
- 2. La sustancia/medicamento implicado puede producir los síntomas del Criterio A.

### AGORAFOBIA

- Temor a lugares y situaciones que pueden causar pánico o hacer sentir atrapado, indefenso o avergonzado.
- El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos

**TRASTORNO DE ANSIEDAD:** Es la respuesta desproporcionada ante un objeto real o imaginario con síntomas como:

- Sensación de nerviosismo, agitación o tensión
- Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe
  - Aumento del ritmo cardíaco
  - Respiración acelerada (hiperventilación)
    - Sudoración
    - Temblores
  - Sensación de debilidad o cansancio
  - Tener problemas para conciliar el sueño
  - Padecer problemas gastrointestinales (GI)
  - Tener dificultades para controlar las preocupaciones

### TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A UNA AFECCIÓN MÉDICA.

- Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico.
- Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.

### TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL

- Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia a otras personas.
- B. En algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos (p. ej., mirarse en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, querer asegurarse de las cosas) o actos mentales (p. ej., comparar su aspecto con el de otros) repetitivos como respuesta a la preocupación por el

### TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

- Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en la actividad laboral o escolar).
- Al individuo le es difícil controlar la preocupación.
- Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.

### TRASTORNO DE ACUMULACIÓN

- Dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones, independientemente de su valor real.
- Esta dificultad es debida a una necesidad percibida de guardarlas cosas y al malestar que se siente cuando uno se deshace de

### TRICOTILOMANÍA

- Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida
- Intentos repetidos de disminuir o dejar de rranicar el pelo.

### TRICOTILOMANÍA

- Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida
- Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el pelo.

### TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

- Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas: Las obsesiones se definen por :
- 1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan, en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante
- 2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o situación temida; sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos.